

۱۰۱. عنصر فرضی X دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی ۲۴ amu و ۲۷ amu است که در شکل مقابل باید به ترتیب با دایره‌های سفید و سیاه رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر ۲۶/۷ amu باشد، چند دایره در شکل باید سیاه رنگ باشد، تا فراوانی ایزوتوپ‌ها را به درستی نشان دهد؟

(ریاضی خارج ۹۸)

- ۱۶ (۱)
- ۱۹ (۲)
- ۲۲ (۳)
- ۲۷ (۴)

۱۰۲. اگر جرم‌های اتمی ایزوتوپ‌های طبیعی کربن برابر ۱۲/۰۰ و ۱۲/۰۳ واحد جرم اتمی و فراوانی آن‌ها به ترتیب ۰/۹۹ و ۰/۰۱ باشد، جرم اتمی میانگین کربن چقدر است؟

- ۱۲/۰۱ (۱)
- ۱۲/۰۸ (۲)
- ۱۲/۱۱ (۳)
- ۱۲/۲۱ (۴)


۱۰۳. اگر عنصر X دارای دو ایزوتوپ ^{61}X و ^{66}X باشد، به ازای هر اتم ^{61}X چند اتم ^{66}X باید وجود داشته باشد تا جرم اتمی میانگین عنصر X برابر ۶۵ شود؟

- ۲ (۱)
- ۳ (۲)
- ۴ (۳)
- ۵ (۴)

۱۰۴. عنصر آهن دو ایزوتوپ دارد و ایزوتوپ سبک‌تر آن، ^{55}Fe است. اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر آن، $\frac{1}{4}$ فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر بوده و جرم اتمی میانگین آن برابر ۵۵/۸ amu باشد، اختلاف تعداد نوترون دو ایزوتوپ آهن چقدر است؟

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

۱۰۵. با توجه به شکل داده‌شده، اگر جرم اتمی میانگین کلر برابر ۳۵/۵ باشد، تعداد نوترون ایزوتوپ سنگین‌تر کلر کدام است؟




- ۱۹ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۱۸ (۳)
- ۲۲ (۴)

۱۰۶. با توجه به داده‌های جدول زیر، جرم مولی ترکیب A_pX_q ، چند amu است؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی با یکای amu در نظر بگیرید.)

ایزوتوپ	۴۵A	۴۷A	۲۵X	۲۷X
درصد فراوانی	۱۰	۹۰	۲۰	۸۰

- ۲۱۳/۶ (۱)
- ۲۰۳/۴ (۲)
- ۱۹۸/۵ (۳)
- ۱۸۸/۷ (۴)

۱۰۷. با توجه به شکل، در خانه‌ای از جدول دوره‌ای که به عنصر منیزیم تعلق دارد، چه عددی به عنوان جرم اتمی منیزیم نوشته می‌شود؟



- ۲۴/۰۸ (۱)
- ۲۴/۸۸ (۲)
- ۲۴/۳۲ (۳)
- ۲۵/۱۲ (۴)

۱۰۸. اگر عنصری دارای سه ایزوتوپ با جرم‌های اتمی ۲۷/۹ amu، ۲۹/۹ amu و ۳۰ amu به ترتیب با فراوانی ۹۲٪، ۵٪ و ۳٪ باشد، جرم اتمی میانگین آن، برابر چند amu است؟

(تجزیه دی ۱۴۰)

- ۲۸/۰۶۳ (۱)
- ۲۸/۸۹۲ (۲)
- ۲۹/۰۵۴ (۳)
- ۲۹/۹۵۱ (۴)

۱۰۹. منیزیم طبیعی دارای سه ایزوتوپ ^{24}Mg با جرم اتمی ۲۳/۹۹ amu و فراوانی ۷۹ درصد، ^{25}Mg با جرم اتمی ۲۴/۹۹ amu و فراوانی ۱۰٪، ^{26}Mg با جرم اتمی ۲۵/۹۸ amu و فراوانی ۱۱ درصد، و فلئور تنها به صورت ^{19}F با جرم اتمی ۱۸/۹۹ amu وجود دارد. جرم مولی منیزیم فلئورید طبیعی برابر چند گرم است؟

(تجزیه خارج ۱۹۹)

- ۶۱/۸۶ (۱)
- ۶۲/۲۸ (۲)
- ۶۴/۱۲ (۳)
- ۶۶/۴۵ (۴)

۱۱۰. عنصر X دارای ۲ ایزوتوپ ^{51}X ، ^{52}X و ^{54}X و جرم اتمی میانگین آن برابر ۵۱/۸ amu است. اگر فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ، ۴ برابر فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ باشد، در نمونه‌ای از عنصر X به جرم ۲۵۰ گرم، چند گرم ایزوتوپ ^{52}X وجود دارد؟

- ۱۲۵ (۱)
- ۱۲۵/۵ (۲)
- ۵۰ (۳)
- ۵۰/۷۵ (۴)

۱۱۱. عنصر X با جرم اتمی میانگین $26/8 \text{ g.mol}^{-1}$ ، دارای سه ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آن‌ها دارای ۲۰ نوترون و فراوانی ۲۰٪ و دیگری ۱۸ نوترون با فراوانی ۷۰٪ است. شمار نوترون‌های ایزوتوپ دیگر کدام است؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر ۱ amu در نظر بگیرید.)

(تجزیه خارج ۹۰)

- ۲۱ (۱)
- ۲۲ (۲)
- ۲۳ (۳)
- ۲۴ (۴)

۱۱۲. عنصر A دارای سه ایزوتوپ ^{84}A ، ^{86}A و ^{88}A است. اگر درصد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ آن ۲۰٪ و جرم اتمی میانگین A برابر ۸۶/۴ باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.)
(تجربی خارج ۹۵)

- (۱) ۶۰ - ۲۰ (۲) ۴۰ - ۴۰ (۳) ۲۰ - ۵۰ (۴) ۲۰ - ۶۰

۱۱۳. کالر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی ۲۵ amu و ۲۷ amu و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی ۱۲ amu و ۱۳ amu است. تفاوت جرم مولکولی سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول CCl_4 چند amu است؟
(ریاضی ۹۴ - با تغییر)

- (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴) ۹

۱۱۴. اگر عنصر A دارای دو ایزوتوپ ^{19}A و ^{20}A و عنصر B دارای سه ایزوتوپ ^{14}B ، ^{15}B و ^{16}B باشد، چند ترکیب BA_3 با جرم مولی متفاوت از هم می‌تواند وجود داشته باشد؟

- (۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۰

۱۱۵. جرم مولی ترکیب A_3B برابر ۶۲/۲ amu است. اگر عنصر A دارای دو ایزوتوپ ^{22}A و ^{23}A و عنصر B دارای دو ایزوتوپ ^{16}B و ^{17}B بوده و فراوانی ایزوتوپ ^{22}A برابر ۲۱٪ باشد، فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر B چقدر است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۲۲ (۳) ۳۰ (۴) ۳۸

۱۱۶. اگر عنصر A دارای سه ایزوتوپ ^{55}A (با فراوانی ۷۵٪)، ^{56}A (با فراوانی ۲۰٪) و ^{57}A (با فراوانی ۵٪) و عنصر B دارای دو ایزوتوپ ^{126}A و ^{131}B بوده و جرم مولی ترکیب AB_3 برابر ۲۰۹/۸۵ گرم بر مول باشد، ۰/۴ مول B شامل چند مول نوترون است؟
(شیمی‌ساز تجربی خارج ۹۹)

- (۱) ۱/۲۴ (۲) ۲/۹۶ (۳) ۴/۸۲ (۴) ۷/۲۵

۱۱۷. از آلیاژ عنصر رنیوم (^{185}Re) در ساخت موتور هواپیماهای جنگی استفاده می‌شود. این عنصر جزو معدود عناصری است که فراوانی ایزوتوپ پایدار آن از فراوانی ایزوتوپ پرتوزای آن (با نیم‌عمر بسیار بالا) کمتر است. جرم اتمی میانگین مخلوطی از دو ایزوتوپ طبیعی این عنصر (^{185}Re و ^{187}Re) برابر ۱۸۶/۲۸ amu می‌باشد. اگر جرم ایزوتوپ سبک‌تر در این مخلوط برابر ۶۶/۶ amu باشد، نسبت فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر به سنگین‌تر برابر بوده و ایزوتوپ پرتوزا است.

- (۱) ^{187}Re ، $\frac{9}{16}$ (۲) ^{187}Re ، $\frac{5}{10}$ (۳) ^{185}Re ، $\frac{9}{16}$ (۴) ^{185}Re ، $\frac{5}{10}$

۱۱۸. عنصر X با جرم اتمی میانگین ۵۱/۸ که در دوره ۴ و گروه ۶ جدول دوره‌ای قرار دارد، دارای ۳ ایزوتوپ ^{51}X ، ^{52}X و ^{53}X است. اگر در یک نمونه طبیعی، به ازای هر ۲ اتم از ایزوتوپ ^{51}X ، یک اتم از هر یک از دو ایزوتوپ دیگر موجود باشد، تعداد نوترون ^{53}X با تعداد الکترون کدام گونه زیر برابر است؟

- (۱) $^{31}Ga^+$ (۲) $^{31}Ga^{3+}$ (۳) $^{29}Cu^{2+}$ (۴) ^{32}Ge

۱۱۹. در فرایند غنی‌سازی مخلوطی از ایزوتوپ‌های عنصر A (^{20}A و ^{22}A) به جرم ۱۰۴ گرم، اگر ۵۰٪ ایزوتوپ‌های سنگین از مخلوط خارج شوند، جرم اتمی میانگین عنصر A در مخلوط باقی‌مانده به ۲۰/۵ گرم بر مول می‌رسد. فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر در مخلوط اولیه چند بوده و در صورتی که فرایند غنی‌سازی به طور ۱۰۰٪ انجام شود، چند گرم ایزوتوپ ^{20}A به‌جای خواهد ماند؟ (هر دو ایزوتوپ پایدارند)

- (۱) ۶۰، ۲۵ (۲) ۴۰، ۲۵ (۳) ۶۰، ۴۰ (۴) ۴۰، ۴۰

۱۲۰. عنصر A دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۴ است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول ۶۵ و فراوانی ایزوتوپ سوم ۱۵ درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ‌ها، برابر جرم اتمی آن‌ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر A، برابر ۵۰/۹۵ amu فرض شود.)
(تجربی ۹۹)

- (۱) ۲۹/۵، ۲۵/۵ (۲) ۱۷/۵، ۴۷/۵ (۳) ۱۵، ۵۰ (۴) ۱۴/۵، ۵۰/۵

شمارش ذره‌ها از روی جرم آن‌ها، مول، عدد آووگادرو



صفحه ۱۱۶ کتاب درسی

اتم‌ها بسیار کوچک هستند به طوری که نمی‌توان با شمارش تک‌تک آن‌ها، شمار آن‌ها را به‌دست آورد. همچنین، در عمل نمی‌توان با یک اتم کار کرد! برای برطرف کردن این مشکل دانشمندان کمیت مول را معرفی کردند.

مول: به 6.02×10^{23} ذره از هر ماده، یک مول از آن ماده گفته می‌شود.

در مورد موادی مانند قلرها یا گازهای نجیب که ذرات تشکیل‌دهنده آن‌ها اتم است، هر 6.02×10^{23} اتم از آن‌ها، معادل یک مول است.

در مورد موادی مانند آب (H_2O)، آمونیاک (NH_3)، گاز نیتروژن (N_2) یا گاز متان (CH_4) که از مولکول‌ها تشکیل شده‌اند، به هر 6.02×10^{23} مولکول از آن‌ها، یک مول گفته می‌شود.

به اقتضای آموختن آووگادرو به عدد 6.02×10^{23} عدد آووگادرو گفته می‌شود. در واقع عدد آووگادرو نمایانگر تعداد ذرات موجود در یک مول از ماده است. عدد آووگادرو را با نماد N_A نشان می‌دهند.

در مورد موادی که از اتم‌ها تشکیل شده‌اند، جرم اتمی آن‌ها برحسب گرم، معادل یک مول از این مواد است.

به عنوان مثال، جرم اتمی آهن برابر ۵۶ گرم بر مول است. پس هر مول آهن معادل ۵۶ گرم است.

در مورد مواد متشکل از مولکول‌ها، جرم مولکولی برحسب گرم، معادل یک مول از این مواد است.

به عنوان مثال، جرم مولکولی آب (H_2O) برابر ۱۸ گرم بر مول است. پس هر مول آب معادل ۱۸ گرم است.

- اگرچه لایه پنجم شامل ۵ زیرلایه است، ولی زیرلایه پنجم (g) در هیچ یک از عنصرهای شناخته شده تا به امروز، الکترونی ندارد. به همین دلیل، حداقل در مقطع دبیرستان و همین طور کنکور، با بیش از چهار نوع زیرلایه (s, p, d, f) سروکار نداریم.
- هر زیرلایه با دو نماد مشخص می شود: یک عدد (که n را مشخص می کند) و یک حرف (که نوع زیرلایه را مشخص می کند). مانند:



- هرچه مقدار l کمتر باشد، نشانگر کمتر بودن انرژی زیرلایه مربوطه است. به عنوان مثال، از نظر انرژی: $2s < 2p$ ، زیرا با n برابر برای دو زیرلایه، مقدار l برای زیرلایه 2s کمتر است.
- انرژی زیرلایه ها هم به مقدار n و هم به مقدار l بستگی دارد. در مورد هر دو عدد کوانتومی n و l، هرچه مقدار کمتری داشته باشند، انرژی الکترون مربوطه کمتر خواهد بود.

قاعده های دقیق برای مقایسه سطح انرژی زیرلایه ها:

- از میان چند زیرلایه، هر کدام از مقدار (n+l) کمتری برخوردار باشد، سطح انرژی کمتری دارد.
 - از دو زیرلایه با «n+l» یکسان، زیرلایه دارای n کوچک تر، انرژی کمتری دارد.
- مثال: مقایسه سطح انرژی زیرلایه های $3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s$:

زیرلایه	3p	3d	4s	4p	4d	4f	5s	5p	5d	6s
n+l	۴	۵	۴	۵	۶	۷	۵	۶	۷	۶
n	۳	۳	۴	۴	۴	۴	۵	۵	۵	۶


مقایسه سطح انرژی: $3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d$

- در زیرلایه دارای عدد کوانتومی قرعی l، حداکثر « $4l+2$ » الکترون می تواند وارد شود. به عنوان مثال:

زیرلایه	4s	4p	4d	4f
l	۰	۱	۲	۳
گنجایش	۲	۶	۱۰	۱۴

قاعده آقا

- ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون مطابق قاعده آقا مشخص می شود.
- اگر از قاعده ای که در قسمت قبل با استفاده از دو عدد کوانتومی n و l برای مقایسه سطح انرژی زیرلایه ها آموختید، بهره بگیرید، دقیقاً به همان ترتیبی می رسید که تحت عنوان قاعده آقا برای پر شدن زیرلایه ها از الکترون ارائه می شود.
- با بلد بودن قاعده آقا و با توجه به گنجایش زیرلایه های s, p, d, f برای الکترون که به ترتیب برابر ۲، ۶، ۱۰، ۱۴ است، می توانید آرایش الکترونی کامل عنصرها را بنویسید.



آرایش الکترونی فشرده

- به تمام پرسش های مطرح شده در کنکورهای گذشته (از زمان حضرت آدم (!) تا حال حاضر) در رابطه با آرایش الکترونی، می توان با نوشتن آرایش الکترونی فشرده به راحتی پاسخ داد، البته با بلد بودن یکسری نکات که همه را خواهیم نوشت، بی کم و کاست.
- نحوه نوشتن آرایش الکترونی فشرده: برای این کار لازم است گازهای نجیب و عدد اتمی آنها را حفظ باشید و همین طور شماره دوره هر یک از آنها را.

شماره دوره جدول	۱	۲	۳	۴	۵	۶
گاز نجیب	${}^2\text{He}$	${}^{10}\text{Ne}$	${}^{18}\text{Ar}$	${}^{36}\text{Kr}$	${}^{54}\text{Xe}$	${}^{86}\text{Rn}$


پس از نوشتن نماد گاز نجیب دوره قبل، بسته به این که گاز نجیب کدام دوره نوشته شده باشد، مطابق یکی از الگوهای زیر ادامه آرایش الکترونی را می نویسیم:

گاز نجیب انتخاب شده	${}^2\text{He}$	${}^{10}\text{Ne}$	${}^{18}\text{Ar}$	${}^{36}\text{Kr}$	${}^{54}\text{Xe}$
شماره دوره عنصر	۲	۳	۴	۵	۶
الگو	$2s \rightarrow 2p$	$3s \rightarrow 3p$	$4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p$	$5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p$	$6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p$

دقت کنید: الگوهای مربوط به عنصرهای دوره های ۲ و ۳ مثل هم و دوره های ۴ و ۵ مثل هم و همین طور، دوره های ۶ و ۷ مثل هم هستند.

شماره دوره عنصر	۲ و ۳	۴ و ۵	۶ و ۷
الگو	$ns \rightarrow np$	$ns \rightarrow (n-1)d \rightarrow np$	$ns \rightarrow (n-2)f \rightarrow (n-1)d \rightarrow np$

مثال:



آرایش غیر عادی ${}_{29}\text{Cu}$ و ${}_{24}\text{Cr}$

اگر آرایش الکترونی ${}_{29}\text{Cu}$ و ${}_{24}\text{Cr}$ را مطابق قاعده آقا بنویسیم، خواهیم داشت:
 ${}_{24}\text{Cr}: [{}_{18}\text{Ar}]4s^2 3d^4$
 ${}_{29}\text{Cu}: [{}_{18}\text{Ar}]4s^2 3d^9$
 ${}_{24}\text{Cr}: [{}_{18}\text{Ar}]4s^1 3d^5$
 ${}_{29}\text{Cu}: [{}_{18}\text{Ar}]4s^1 3d^{10}$
 لازم است بدانید که آرایش الکترونی ${}_{24}\text{Cr}$ و ${}_{29}\text{Cu}$ به این صورت نیست، بلکه به صورت روبه‌رو است:
 داده‌های طیف‌سنجی نشان داده است که آرایش الکترونی کروم و مس از قاعده آقا تبعیت نکرده و به‌صورتی است که نشان دادیم که بیرونی‌ترین زیرلایه $4s$ فقط دارای یک الکترون است.


تذکره: در عناصر واسطه واقع در دوره‌های پایین‌تر جدول دوره‌ای ممکن است آرایش d^9 یا d^4 نیز وجود داشته باشد و یا موارد دیگری از عدم تبعیت کامل از قاعده آقا وجود داشته باشد. بررسی این موضوع جزء برنامه دبیرستان و کنکور نیست و پرداختن به آن، نادرست است. ولی باید بدانید که اگر آرایش عنصر واسطه‌ای از دوره‌های پنجم یا پایین‌تر در کنکور مطرح شود، لابد قواعد حاکم بر آن‌ها همانند دوره چهارم است و گرنه طراح تست اجازه طرح سؤال از آن عنصرها را نداشت. پس بهتر است شما آرایش عنصرهای واسطه دوره‌های پایین‌تر را هم همانند دوره چهارم جدول در نظر بگیرید.

عنصرهای دسته f و d, p, s

هریک از عنصرهای جدول دوره‌ای به یکی از این چهار دسته تعلق دارد: دسته s ، دسته p ، دسته d یا دسته f . تعیین‌کننده دسته عنصر، نوع آخرین زیرلایه‌ای است که الکترون وارد آن شده است (مطابق قاعده آقا).



در جدول دوره‌ای، عنصرهای دسته s در دو گروه ۱ و ۲ و عنصر اول گروه ۱۸، عنصرهای دسته d در گروه‌های ۳ تا ۱۰ و عنصرهای دسته p در گروه‌های ۱۳ تا ۱۸ قرار گرفته‌اند. عنصرهای دسته f در دو خانه انتهایی گروه ۳ قرار داده شده‌اند.




توجه: هلیوم در گروه ۱۸ قرار دارد، ولی از دسته s است.


به عنصرهای دسته‌های s و p ، عنصرهای اصلی و به عنصرهای دسته d ، عنصرهای واسطه می‌گویند. عنصرهای دسته f به عنصرهای واسطه داخلی معروفاند.

لایه ظرفیت عنصرها

لایه ظرفیت یک عنصر دربردارنده الکترون یا الکترون‌هایی است که در رفتار شیمیایی آن عنصر دخالت دارند. در عنصرهای اصلی (دسته‌های s و p)، الکترون‌های موجود در آخرین لایه الکترونی لایه ظرفیت عنصر را تشکیل می‌دهند، مثال:



در عنصرهای واسطه (دسته d)، الکترون‌های موجود در زیرلایه s آخرین لایه الکترونی به اضافه الکترون‌های موجود در زیرلایه d لایه ماقبل آخر، لایه ظرفیت عنصر را تشکیل می‌دهند.



مثال:

دقت کنید: ظرفیت یک عنصر را با لایه ظرفیت آن اشتباه نگیرید! به عنوان مثال، آهن در ترکیب‌های خود از دو ظرفیت ۲ و ۳ برخوردار است. درحالی که دارای ۸ الکترون در لایه ظرفیت خود است.

آرایش الکترونی و جدول دوره‌ای

با توجه به آرایش الکترونی هر عنصر، موقعیت (شماره دوره و گروه) آن در جدول دوره‌ای را می‌توان مشخص کرد:

برای تعیین شماره دوره عنصری که آرایش الکترونی آن مشخص شده است، کافی است به ضریب عددی مربوط به زیرلایه s یا p در لایه ظرفیت عنصر توجه کنیم. ضریب عددی زیرلایه s در لایه ظرفیت = شماره دوره عنصر



ضریب عددی زیرلایه p در لایه بیرونی هر اتم با ضریب عددی زیرلایه s یکسان است.

مثال ۱:

$$[18Ar] 4s^2 3d^5 \Rightarrow \text{شماره دوره} = 4$$

$$[18Ar] 4s^2 3d^1 4p^2 \Rightarrow \text{شماره دوره} = 4$$

■ برای تعیین شماره گروه عنصرها با توجه به دسته و آرایش الکترونی لایه ظرفیت آن‌ها از یکی از قواعد زیر استفاده می‌کنیم:

تعداد الکترون زیرلایه s در لایه ظرفیت = شماره گروه : دسته s

+۱۲ تعداد الکترون زیرلایه p در لایه ظرفیت = شماره گروه : دسته p

مجموع تعداد الکترون در زیرلایه‌های s و d لایه ظرفیت = شماره گروه : دسته d

۳ = شماره گروه : دسته f

مثال ۲:

$$[18Ar] 4s^2 \Rightarrow \text{دسته s} \Rightarrow \text{شماره گروه} = 2$$

$$[18Ar] 4s^2 3d^1 4p^2 \Rightarrow \text{دسته p} \Rightarrow \text{شماره گروه} = 2 + 12 = 14$$

$$[18Ar] 4s^2 3d^5 \Rightarrow \text{دسته d} \Rightarrow \text{شماره گروه} = 2 + 5 = 7$$

$$[54Xe] 6s^2 4f^3 \Rightarrow \text{دسته f} \Rightarrow \text{شماره گروه} = 3$$

اگر عدد اتمی عنصری مشخص باشد، برای مشخص کردن شماره دوره و گروه آن دو روش وجود دارد:

روش ۱ رسم آرایش الکترونی و تعیین شماره دوره و گروه عنصر با توجه به قواعدی که گفته شد.

روش ۲ استفاده از گازهای نجیب.

مثال ۳:


$$56X \Rightarrow \begin{cases} \text{دوره ۶} \Rightarrow \text{از } 54Xe \text{ عبور کرده (گاز نجیب دوره پنجم)} \\ \text{شماره گروه} = 56 - 54 = 2 \end{cases}$$

$$50Y \Rightarrow \begin{cases} \text{دوره ۵} \Rightarrow \text{از } 36Kr \text{ عبور کرده (گاز نجیب دوره چهارم)} \\ \text{شماره گروه} = 18 - (54 - 50) = 14 \end{cases}$$

آرایش الکترونی و عددهای کوانتومی اصلی و فرعی

■ در آرایش الکترونی هر عنصر، ضریب عددی هر زیرلایه نشان می‌دهد که آن زیرلایه به کدام لایه الکترونی متعلق است و عدد کوانتومی اصلی الکترون‌های مربوطه را مشخص می‌کند. همینطور یکی از چهار حرف s, p, d, یا f در نماد هر زیرلایه، نوع زیرلایه و عدد کوانتومی فرعی الکترون‌های موجود در آن زیرلایه را نشان می‌دهد.

مثال ۱:



قطعاً! یادتون نرفته که عدد کوانتومی فرعی (l) مشخص کننده نوع زیرلایه است:

نوع زیرلایه	s	p	d	f
l	0	1	2	3

■ تعیین عددهای کوانتومی اصلی (n) و فرعی (l) تک تک الکترون‌های یک اتم:

اگر نماد کلی هر زیرلایه را به صورت nl نشان دهیم، عدد کوانتومی اصلی تمام الکترون‌های موجود در آن زیرلایه، برابر n و عدد کوانتومی فرعی تمام الکترون‌های موجود در آن زیرلایه، برابر عددی است که مطابق جدول قوق از روی نوع زیرلایه مشخص می‌شود.

مثال ۲:

$$3d^8$$

یعنی ۸ الکترون با عدد کوانتومی فرعی l=2 یعنی ۸ الکترون با عدد کوانتومی اصلی n=3

مثال ۳: در اتم ^{15}P مجموع عددهای کوانتومی اصلی کل الکترون‌ها و مجموع عددهای کوانتومی فرعی کل الکترون‌ها را حساب کنید.

^{15}P	$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^3$	مقدار n
	1	2	2	3	3	

$$\Rightarrow \text{مجموع مقادیر n کل الکترون‌ها} = 2(1) + 8(2) + 5(3) = 33$$

^{15}P	$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$	$3s^2$	$3p^3$	مقدار l
	0	0	1	0	1	

$$\Rightarrow \text{مجموع مقادیر l کل الکترون‌ها} = 6(1) + 3(1) = 9$$

سؤالات چهارگزینه‌ای

۷ توزیع الکترون‌ها در اتم - اعداد کوانتومی - آرایش الکترونی

- لایه و زیرلایه - عدد کوانتومی اصلی و فرعی: تست‌های ۱۹۴ تا ۲۰۶
- لایه ظرفیت: تست‌های ۲۲۲ تا ۲۳۸
- آرایش الکترونی و عددهای کوانتومی: تست‌های ۲۵۸ تا ۲۷۲
- ترتیب پرشدن الکترون در زیرلایه‌ها - آرایش الکترونی: تست‌های ۲۰۷ تا ۲۲۱
- آرایش الکترونی و جدول دوره‌ای: تست‌های ۲۳۹ تا ۲۵۷

لایه و زیرلایه - عدد کوانتومی اصلی و فرعی



۱۹۴. کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) عدد کوانتومی اصلی (n) نشان می‌دهد که الکترون در کدام لایه الکترونی قرار دارد.
- (۲) لایه n شامل n زیرلایه است.
- (۳) لایه n ام گنجایش $2n^2$ الکترون را دارد.
- (۴) اگر عدد کوانتومی اصلی الکترونی برابر n باشد، عدد کوانتومی فرعی آن یکی از عددهای صحیح از صفر تا حداکثر n است.

۱۹۵. شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l=1$ در اتم X ، چند برابر شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l=2$ در اتم Z است؟ (مجموعه ۱۴۶)

- (۱) $2/2$ (۲) $2/0$ (۳) $1/8$ (۴) $1/6$

(ریاضی خارج ۹۸)

۱۹۶. کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟

- (آ) سومین لایه الکترونی اتم، زیرلایه‌های $3s$ ، $3p$ و $3d$ را دربردارد.
 (ب) ترتیب پر شدن زیرلایه‌ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی (n) وابسته است.
 (پ) در سومین دوره جدول دوره‌ای (تناوبی)، ۱۸ عنصر جای دارند که از میان آن‌ها دو عنصر، گازی‌اند.
 (ت) در اتم عنصرهای دوره سوم جدول دوره‌ای (تناوبی)، زیرلایه‌های $3s$ و $3p$ از الکترون پر می‌شوند.
- (۱) آ، ت (۲) ب، پ (۳) آ، پ، ت (۴) آ، ب، ت

(ریاضی ۱۳۰)

۱۹۷. چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- هر زیر لایه با اعداد کوانتومی n و l ، مشخص می‌شود.
 - ترتیب پر شدن زیرلایه‌ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.
 - از رابطه $a = 4l + 2$ ، گنجایش الکترونی زیرلایه‌ها (a) را می‌توان تعیین کرد.
 - در اتم Cu ، نسبت شمار الکترون‌های دارای $l=0$ به $l=2$ ، برابر $7/1$ است.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴
۱۹۸. در لایه چهارم زیرلایه وجود دارد که در مجموع الکترون را می‌توانند در خود جای دهند.
- (۱) $4-22$ (۲) $4-18$ (۳) $3-18$ (۴) $3-16$

(تجزیه خارج ۱۴۰)

۱۹۹. با کدام گزینه‌ها، مفهوم علمی جمله زیر به درستی کامل می‌شود؟

- «در میان عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم آن‌ها»
- (آ) ده الکترون، عددهای کوانتومی $n=3$ و $l=2$ دارند.
 (ب) یک الکترون، عددهای کوانتومی $n=2$ و $l=0$ دارد.
 (پ) در آخرین لایه الکترونی، تنها یک الکترون وجود دارد.
 (ت) دوازده الکترون، عددهای کوانتومی $n=2$ و $l=1$ دارند.
- (۱) آ، ب (۲) ب، ت (۳) آ، پ (۴) ب، ت

۲۰۰. الکترونی دارای عدد کوانتومی $l=2$ است. کدام مورد نمی‌تواند درباره آن درست باشد؟

- (۱) قراردادن در لایه چهارم
- (۲) قرار داشتن در لایه سوم
- (۳) داشتن انرژی بیشتر نسبت به الکترون واقع در زیرلایه $4f$
- (۴) داشتن انرژی کمتر نسبت به الکترون واقع در زیرلایه $3s$

۲۰۱. الکترونی دارای عدد کوانتومی $n=3$ است. کدام مورد نمی‌تواند درباره آن درست باشد؟

- (۱) تعلق داشتن به زیرلایه‌ای با $l=2$
- (۲) داشتن سطح انرژی بالاتر نسبت به الکترون واقع در زیرلایه $4s$
- (۳) داشتن سطح انرژی پایین‌تر نسبت به الکترونی با عدد کوانتومی $l=2$
- (۴) تعلق داشتن به زیرلایه‌ای با $l=3$

۲۰۲. در کدام گزینه، درستی یا نادرستی عبارتهای زیر به ترتیب از راست به چپ، به درستی مشخص شده است؟
 (آ) مطابق قاعده آفبا، سطح انرژی زیرلایه $6s$ کمتر از $5d$ و بیشتر از سطح انرژی $4f$ می باشد.
 (ب) با استفاده از روشهای طیفسنجی می توان آرایش الکترونی همه عناصر را پیش بینی کرد.
 (پ) مطابق قاعده آفبا، میان هر دو زیرلایه، آن که دارای n کوچک تری است، در اشغال شدن از الکترون تقدم دارد.
 (ت) اولین عنصری که از قاعده آفبا پیروی نمی کند؛ دارای یک الکترون در لایه ظرفیت خود می باشد.
 (ث) آفبا به معنای ساختن یا افزایش گام به گام است.

- (۱) نادرست - درست - نادرست - نادرست - درست
 (۲) نادرست - نادرست - درست - درست - نادرست
 (۳) درست - نادرست - نادرست - نادرست - درست
 (۴) نادرست - درست - نادرست - درست - درست

۲۰۳. از میان عبارتهای زیر چند مورد درست است؟

(آ) گنجایش لایه سوم برای الکترون برابر ۱۸ است.
 (پ) گنجایش لایه پنجم برای الکترون برابر ۵۰ است.
 (ث) سطح انرژی $5p$ بالاتر از $4d$ است.

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۲۰۴. در آرایش الکترونی اتم ${}_{36}Kr$ ، الکترون با اعداد کوانتومی $n=2$ و $l=2$ و الکترون با اعداد کوانتومی $n=4$ و $l=1$ وجود دارد.

(تجربی خارج ۹۰ - یا تغییر)

- (۱) ۶ - ۱۰ (۲) ۸ - ۱۸ (۳) ۸ - ۱۰ (۴) ۶ - ۱۸

۲۰۵. در چهارمین لایه الکترونی اتم عنصرها، مقدار برای عدد کوانتومی l در کل الکترون در آن جای می گیرد و عنصرهایی که آخرین الکترون آنها در زیرلایه های مربوط به این لایه قرار می گیرند، در دوره مختلف جدول تناوبی جای دارند.

(تجربی خارج ۹۲ - یا تغییر)

- (۱) ۱۶، ۳ دو (۲) ۱۶، ۳ سه (۳) ۲۲، ۴ دو (۴) ۲۲، ۴ سه

۲۰۶. اگر تعداد نوترون در یون ${}^{119}X^{4+}$ ، یک و نیم برابر تعداد الکترون آن باشد، چند الکترون با عدد کوانتومی $l=1$ در اتم X وجود دارد؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۲۲ (۳) ۲۶ (۴) ۲۸

ترتیب پر شدن الکترون در زیرلایه ها - آرایش الکترونی



۲۰۷. ضمن پر شدن زیرلایه های یک اتم از الکترون، بعد از زیرلایه $5s$ ، زیرلایه $4f$ پر شدن زیرلایه $4f$ ، زیرلایه $5d$ و قبل از پر شدن زیرلایه $4f$ ، زیرلایه $5d$ پر می شود.

- (۱) $5d - 4f$ (۲) $6s - 4d$ (۳) $6s - 5p$ (۴) $5p - 4d$

۲۰۸. در آخرین لایه الکترونی و آخرین زیرلایه از اتم ${}_{33}X$ به ترتیب چند الکترون وجود دارد؟

- (۱) ۳ - ۱۵ (۲) ۵ - ۱۵ (۳) ۳ - ۵ (۴) ۲ - ۵

(ریاضی ۸۸)

۲۰۹. در چند اتم عنصرهای واسطه تناوب چهارم، زیرلایه $2d$ به ترتیب، نیمه پر و پر شده است؟

- (۱) ۲، ۲ (۲) ۳، ۲ (۳) ۲، ۳ (۴) ۱، ۱

۲۱۰. اختلاف تعداد الکترون در آخرین لایه الکترونی دو عنصر ${}_{33}X$ و ${}_{32}Y$ برابر و مجموع تعداد الکترون در آخرین زیرلایه این دو عنصر برابر است.

- (۱) ۷ - ۲ (۲) ۷ - ۴ (۳) ۴ - ۲ (۴) ۴ - ۴

۲۱۱. در کدام عنصر زیر، تعداد الکترون دو لایه آخر الکترونی تفاوت بیشتری دارد؟

- (۱) ${}_{36}Kr$ (۲) ${}_{53}I$ (۳) ${}_{25}Mn$ (۴) ${}_{24}Cr$

۲۱۲. اگر $\frac{9}{16}$ از عدد جرمی عنصر X به نوترون های آن مربوط باشد و در یون X^{2+} اختلاف تعداد نوترون و الکترون، برابر ۱۵ باشد، اختلاف تعداد الکترون در دو لایه آخر اتم آن چقدر است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۱۰ (۳) ۱۱ (۴) ۱۳

۲۱۳. اختلاف تعداد الکترون کدام دو عنصر در آخرین لایه الکترونی بیشتر است؟

- (۱) ${}_{28}Ni - {}_{17}Cl$ (۲) ${}_{34}Se - {}_{20}Ca$ (۳) ${}_{54}Xe - {}_{43}Tc$ (۴) ${}_{83}Bi - {}_{56}Ba$

۲۱۴. کدام دو عنصر به دسته یکسانی از عنصرها (دسته s ، p ، d یا f) تعلق ندارند؟

- (۱) ${}_{42}B - {}_{21}A$ (۲) ${}_{53}D - {}_{21}C$ (۳) ${}_{55}F - {}_{25}E$ (۴) ${}_{82}H - {}_{48}G$

۲۱۵. کدام دو عنصر از نظر نوع زیرلایه های که آخرین الکترون را گرفته، به دسته یکسانی از عنصرها تعلق ندارند ولی تعداد الکترون موجود در بیرونی ترین زیرلایه آنها یکسان است؟

- (۱) ${}_{50}B - {}_{29}A$ (۲) ${}_{49}D - {}_{24}C$ (۳) ${}_{85}F - {}_{35}E$ (۴) ${}_{75}H - {}_{25}G$

۲۱۶. عنصری از دسته d که تعداد الکترون آن در آخرین زیرلایه از نوع p برابر با تعداد الکترون در آخرین زیرلایه از نوع d است، می تواند دارای عدد اتمی یا باشد.

- (۱) ۴۶ - ۲۶ (۲) ۴۶ - ۲۸ (۳) ۴۴ - ۲۶ (۴) ۴۴ - ۲۸


مثال ۳: برای تولید ۱۱ گرم گاز کربن دی‌اکسید، چند میلی‌لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP لازم است تا با مقدار کافی گاز اتان در واکنش سوختن کامل وارد شود؟

$$11 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44 \text{ g CO}_2} \times \frac{7 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol CO}_2} \times \frac{22400 \text{ mL O}_2}{1 \text{ mol O}_2} = 9800 \text{ mL O}_2$$

پاسخ:

توجه: در برخی از مسائل، حجم گاز در شرایط غیر STP مطرح شده و حجم مولی گازها در آن شرایط، مشخص شده است. در این صورت، به جای عددهای ۲۲/۴ لیتر یا ۲۲۴۰۰ میلی‌لیتر، از حجم مولی ارائه شده برای تبدیل مول و حجم گاز به یکدیگر استفاده می‌کنیم.

مثال ۴: با اثر دادن ۱۰/۸ گرم فلز آلومینیم بر هیدروکلریک اسید مطابق واکنش زیر، چند لیتر گاز هیدروژن حاصل می‌شود؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش، ۲۵ لیتر فرض شود). ($\text{Al} = 27 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)



$$10/8 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{25 \text{ L H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 15 \text{ L H}_2$$

پاسخ:


توجه: در برخی از مسائل که حجم گاز مطرح شده است، به جای ارائه حجم مولی گازها، چگالی گاز ارائه می‌شود. در این صورت، به جای تبدیل مستقیم مول و حجم گاز به یکدیگر، از یکی از دو تبدیل زیر استفاده می‌کنیم: (با فرض این که چگالی گاز بر حسب $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ باشد)

$$\text{تعداد مول گاز} \xrightarrow{(1)} \text{جرم گاز (g)} \xrightarrow{(2)} \text{حجم گاز (L)}$$

$$\text{تعداد مول گاز} \xrightarrow{(4)} \text{جرم گاز (g)} \xrightarrow{(3)} \text{حجم گاز (L)}$$

تبدیل	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
کسر تبدیل	$\frac{\text{جرم مولی گاز}}{1}$	$\frac{1}{\text{چگالی گاز}}$	$\frac{\text{چگالی گاز}}{1}$	$\frac{1}{\text{جرم مولی گاز}}$

مثال ۵: برای تولید ۲۰ لیتر گاز هیدروژن با چگالی ۰/۹ گرم بر لیتر، لازم است چند گرم فلز آلومینیم را با هیدروکلریک اسید وارد واکنش کنیم؟ ($\text{Al} = 27, \text{H} = 1: \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)



$$20 \text{ L H}_2 \times \frac{0/9 \text{ g H}_2}{1 \text{ L H}_2} \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ g H}_2} \times \frac{2 \text{ mol Al}}{3 \text{ mol H}_2} \times \frac{27 \text{ g Al}}{1 \text{ mol Al}} = 162 \text{ g Al}$$

پاسخ:

مثال ۶: با اثر دادن ۱۶/۲ گرم فلز Al بر هیدروکلریک اسید، چند لیتر گاز هیدروژن با چگالی ۰/۶ گرم بر لیتر حاصل می‌شود؟

$$(\text{Al} = 27, \text{H} = 1: \text{g}\cdot\text{mol}^{-1})$$

$$16/2 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{1 \text{ L H}_2}{0/6 \text{ g H}_2} = 2 \text{ L H}_2$$

پاسخ:

استوکیومتری واکنش‌ها با روش برابری نسبت مول به ضریب مواد

اگر A و B دو ماده از یک واکنش باشد که ضرایب استوکیومتری آن‌ها در معادله موازنه شده واکنش، به ترتیب برابر a و b باشد، خواهیم داشت:

$$\frac{\text{تعداد مول A}}{a} = \frac{\text{تعداد مول B}}{b}$$

برای استفاده از این رابطه، کافی است بتوانیم مقدار مواد با یک‌گانه‌ای مختلف را به تعداد مول آن‌ها تبدیل کنیم. در جدول زیر چگونگی این تبدیل را در حالت‌های مختلف مشاهده می‌کنید: (البته تا این قسمت از کتاب درسی، فقط موارد ارائه شده در جدول (I) را خوانده‌اید و موارد ذکر شده در جدول (II) را در قسمت‌های بعدی خواهید دید.)

جدول (I): مواردی که تاکنون خوانده‌اید:

رابطه محاسبه تعداد مول	داده‌ها
$\frac{\text{جرم (خالص) بر حسب گرم}}{\text{جرم مولی}}$	جرم خالص ماده (به گرم)
$\frac{\text{تعداد مولکول (یا اتم)}}{\text{عدد آووگادرو}}$	تعداد مولکول (یا اتم)
$\frac{\text{حجم گاز به لیتر در شرایط STP}}{22/4}$	حجم گاز در شرایط STP (بر حسب لیتر)
$\frac{\text{حجم گاز به میلی‌لیتر در شرایط STP}}{22400}$	حجم گاز در شرایط STP (بر حسب میلی‌لیتر)
$\frac{\text{چگالی گاز (g}\cdot\text{L}^{-1}\text{)} \times \text{حجم گاز به لیتر}}{\text{جرم مولی}}$	حجم گاز بر حسب لیتر و چگالی گاز بر حسب $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$

جدول (II): مواردی که در فصل یا پایه‌های بعد می‌خوانید:

رابطه محاسبه تعداد مول	داده‌ها
غلظت مولی \times حجم محلول به لیتر	غلظت مولی و حجم محلول (به لیتر)
$\frac{\text{درصد جرمی}}{100} \times \text{جرم محلول به گرم}$ جرم مولی	درصد جرمی و جرم محلول
$\frac{\text{غلظت ppm}}{10^6} \times \text{جرم محلول به گرم}$ جرم مولی	غلظت ppm و جرم محلول
$\frac{10 \times a \times d}{\text{جرم مولی}} \times \text{حجم محلول به لیتر}$ a: درصد جرمی محلول (بدون %) d: چگالی محلول با یکای گرم بر میلی‌لیتر	درصد جرمی و چگالی محلول (به g.mL^{-1})
$\frac{\text{درصد خلوص}}{100} \times \text{جرم ناخالص ماده بر حسب گرم}$ جرم مولی	جرم ناخالص ماده (به گرم) و درصد خلوص
$\frac{\text{انحلال پذیری}}{100 + \text{انحلال پذیری}} \times \text{جرم محلول سیرشده به گرم}$ جرم مولی	انحلال‌پذیری و جرم محلول سیرشده

توجه: در فصل اول شیمی یازدهم، با بازده درصدی آشنا خواهید شد. اما بهتر است از همین الان بدانید که اگر بازده درصدی در مسئله‌ای مطرح شده باشد، باید مقدار $\frac{\text{بازده}}{100}$ را در کسر مول به ضریب مربوط به واکنش‌دهنده ضرب کنیم. هرگاه هر دو ماده واکنش‌دهنده بوده و بازده درصدی مطرح شده باشد، مقدار $\frac{\text{بازده}}{100}$ را در کسر مول به ضریب مربوط به واکنش‌دهنده مجهول ضرب می‌کنیم.

■ در حل هر مسئله به روش برابری مول به ضریب، به جای کمیت مجهول، نماد X را قرار می‌دهیم.

« دو کلمه حرف حساب! »

برخی از دانش‌آموزان از این که یک‌سری قرمول را برای استفاده در حل مسائل حفظ کنند، گارد می‌گیرند! خود من هم که دانش‌آموز بودم، چنین گاردی را در برابر حفظ کردن قرمول‌ها داشتم. چنین قرمول‌هایی از قدیم تا حال حاضر در برخی کتاب‌ها تحت عنوان «کسرهای پیش‌ساخته» ارائه شده‌اند. راستش این قرمول‌ها قابل حفظ کردن نیستند! و قرار هم نیست که حفظشان کنید، همانند طوطی! در واقع شما باید از طریق مفاهیمی که یاد گرفته‌اید، بتوانید در حالت‌های مختلف، تعداد مول یک ماده را حساب کنید تا $\frac{\text{مول}}{\text{ضریب}}$ دو ماده را برابر هم قرار دهید.

باور کنید من که این قرمول‌ها و روابط را در جدول‌های (I) و (II) براتون ارائه کردم، خودم هم طوطی‌وار آن‌ها را حفظ نیستم، قرقی هم نمی‌کند که حفظ باشم یا نه، چون خودشان بر اساس آموخته‌ها و مفاهیمی که یاد گرفته‌ایم، روی کاغذ می‌آیند. البته چند بار که بر اساس حساب و کتاب و مفاهیم آموخته‌شده و با تأنی، قرمول را دربیارید و بسازید، قرمول در ذهن‌تان حک می‌شود و دفعات بعد، با سرعت بیشتری می‌توانید آن را روی کاغذ بیاورید. اما اگر مدتی از قرمول معینی استفاده نکردید و از ذهن‌تان خارج شد، با اندکی تمرکز بر آموخته‌ها و مفاهیم، باز هم قادر به درآوردن قرمول خواهید بود.

به عنوان نمونه، وقتی حجم گاز به لیتر و چگالی آن با یکای گرم بر لیتر داده‌شده و جرم مولی گاز هم مشخص است، برای تعیین تعداد مول این نمونه گاز، کافی است حجم گاز (V L) را در چگالی آن ($d \text{ (g.L}^{-1}\text{)}$) ضرب کنید تا به جرم گاز بر حسب گرم برسید و جرم گاز را به جرم مولی آن (g.mol^{-1}) تقسیم کنید تا به تعداد مول گاز برسید.

$$V(L) \times d(\text{g.L}^{-1}) \longrightarrow (V \times d)g$$

$$\frac{V \times d(g)}{\text{جرم مولی } (\text{g.mol}^{-1})} \longrightarrow \frac{V \times d}{\text{جرم مولی}} (\text{mol})$$

یکی از قرمول‌های ارائه‌شده در جدول

یکایک قرمول‌های ارائه‌شده در جدول (I) و (II) بر اساس مفاهیمی که بلدید، ساخته می‌شوند و شما خودتان باید آن‌ها را بسازید و در ساختن آن‌ها، مهارت و سرعت عمل لازم را به دست آورید، نه این که حفظشان کنید، عین طوطی! مگر شما طوطی هستید؟ پس ارائه این قرمول‌ها تحت عنوان «کسرهای پیش‌ساخته» کاری نادرست و دور از شأن شیمی و مقایر با اصول آموزش شیمی است.

برای این که متوجه شوید که با استفاده از روش برابری مول به ضریب، چقدر سریع‌تر به پاسخ می‌رسید، بهتر است شش مثال حل‌شده با استفاده از روش تشریحی کسرهای تبدیل را یک بار هم با روش برابری مول به ضریب حل کنیم:

انحلال پذیری مواد جامد در آب

به مقدار ماده حل شونده بر حسب گرم که در دمای معین در ۱۰۰ گرم آب حل شده و محلول سیر شده پدید می‌آورد، انحلال پذیری این ماده در دمای آزمایش گفته می‌شود. رابطه مربوط به محاسبه انحلال پذیری در کتاب درسی نیامده (!)، ولی از تعریف آن قابل استنباط است. همان‌طور که در کتاب درسی قبلی هم به همین صورت بوده است، ولی بارها در کنکور مورد سؤال قرار گرفت.

$$\text{انحلال پذیری} = \frac{\text{جرم حل شونده بر حسب گرم}}{\text{جرم حلال بر حسب گرم}} \times 100$$

مثال ۱: اگر در دمای معینی، ۲۵۰ گرم از محلول سیر شده یک نمک شامل ۵۰ g از آن نمک باشد، انحلال پذیری این نمک در این دما برابر چند گرم است؟

$$\text{انحلال پذیری} = \frac{50}{250 - 50} \times 100 = 25 \text{ g}$$

پاسخ:

مواد حل شونده بر اساس میزان انحلال پذیری در آب، به ۳ دسته محلول، کم محلول و نامحلول دسته بندی شده‌اند.

مثال ۲: اگر ۲۰۰ میلی لیتر محلول سیر شده کلسیم برمید با چگالی ۱/۲۵ گرم بر میلی لیتر دارای ۵۰ گرم CaBr_2 باشد، انحلال پذیری کلسیم برمید در این شرایط چقدر است؟

پاسخ: در واقع $(200 \times 1/25)$ گرم از محلول سیر شده، دارای ۵۰ گرم CaBr_2 است؛ بنابراین:

$$\text{انحلال پذیری} = \frac{\text{جرم نمک حل شده}}{\text{جرم حلال}} \times 100 = \frac{50}{(200 \times 1/25) - 50} \times 100 = \frac{25 \text{ g CaBr}_2}{100 \text{ g H}_2\text{O}}$$

رابطه میان انحلال پذیری و انواع غلظت

برای هر یک از انواع غلظت می‌توان قرمولى میان آن با انحلال پذیری ارائه کرد. اما این کار موجب تضعیف شیمی شما شده و در نهایت، به نتیجه مطلوبی هم نخواهید رسید. به جای این کار، بهتر است روشی برای رسیدن از انحلال پذیری به هر یک از انواع غلظت یا بالعکس ارائه دهیم. این روش هرگز قراموشتان نخواهد شد، به ویژه اگر در حل چند سؤال از آن استفاده کنید.

روش رسیدن از انحلال پذیری به انواع غلظت یا بالعکس: از کمیت معلوم، دو عدد، یکی برای مقدار حل شونده و دیگری برای مقدار محلول یا حلال، به دست می‌آوریم. سپس قرمول مربوط به محاسبه کمیت مجهول (انحلال پذیری یا یکی از غلظت‌ها) را نوشته و دو عدد به دست آمده از کمیت معلوم را برای محاسبه کمیت مجهول مورد استفاده قرار می‌دهیم.

مثال ۱: اگر در دمای معینی، انحلال پذیری NaOH برابر ۶۰ g در ۱۰۰ g آب باشد، غلظت ppm سدیم هیدروکسید در محلول سیر شده سود در این دما، چقدر است؟

پاسخ:

$$\text{انحلال پذیری} = \begin{cases} 60 \text{ g NaOH} \\ 100 \text{ g H}_2\text{O} \end{cases} \Rightarrow \text{کمیت معلوم}$$

$$\text{کمیت مجهول} = \text{ppm} \Rightarrow \text{ppm} = \frac{\text{جرم NaOH}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{60}{100 + 60} \times 10^6 = 3/75 \times 10^5 \text{ ppm}$$

مثال ۲: اگر درصد جرمی NaOH در محلول سیر شده آن، برابر ۲۰ باشد، انحلال پذیری NaOH در این شرایط چقدر است؟

پاسخ:

$$\text{درصد جرمی} = \begin{cases} 20 \text{ g NaOH} \\ 100 \text{ g (محلول)} \end{cases} \Rightarrow \text{کمیت معلوم}$$

$$\text{کمیت مجهول} = \text{انحلال پذیری} = \frac{\text{جرم NaOH}}{\text{جرم حلال}} \times 100 = \frac{20}{100 - 20} \times 100 = 25 \text{ g}$$

مثال ۳: اگر انحلال پذیری NaOH در دمای معینی، برابر ۶۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب و چگالی محلول سیر شده سود در این دما، برابر ۲ گرم بر میلی لیتر باشد، غلظت مولی محلول سیر شده سود در این دما، چند مول بر لیتر است؟ ($\text{NaOH} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$)

پاسخ:

$$\text{انحلال پذیری} = \begin{cases} 60 \text{ g NaOH} \\ 100 \text{ g (آب)} \end{cases} \Rightarrow \text{کمیت معلوم}$$


$$\text{کمیت مجهول} = \text{غلظت مولار} = \frac{\text{تعداد مول NaOH}}{\text{حجم محلول به میلی لیتر}} \times 1000$$

$$\text{غلظت مولار} = \frac{60 \text{ mol}}{40} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 18/75 \text{ mol.L}^{-1}$$

چند مثال مهم از مواد محلول، کم محلول و نامحلول در آب (که باید حفظشون کنید):

مواد محلول: شکر - اتانول - استون - همه ترکیب‌های یونی حاوی نیترات - همه ترکیب‌های فلزهای قلیایی
 مواد نامحلول: کلسیم فسفات - منیزیم فسفات - منیزیم هیدروکسید - نقره کلرید - باریوم سولفات - هگزان - پد
 مواد کم محلول: کلسیم سولفات

تغییر انحلال پذیری نمک‌ها با تغییر دما



همان‌طور که نمودار روبه‌رو نشان می‌دهد، انحلال پذیری نمک‌ها در آب با تغییر دما دچار تغییر می‌شود، البته شدت این تغییرات برای نمک‌های مختلف، متفاوت است. مثلاً در مورد سدیم کلرید، با تغییر دما، انحلال پذیری آن تغییر چندانی نمی‌کند، اما در مورد پتاسیم نیترات، تغییر انحلال پذیری آن نسبت به تغییر دما، بسیار زیاد است.

در ارتباط با نمودار تغییرات انحلال پذیری نمک‌ها نسبت به دما، مسائل متنوعی قابل طرح است. پنج تیپ شناخته‌شده و رایج از این مسائل را در این جا ارائه می‌کنیم. نظیر تمامی این مسائل به دفعات در کنکورهای گذشته مطرح شده‌اند. یک تیپ جذاب هم در انتها قرار دادیم که مثل آن در کنکورهای قبل هنوز نیومده.

$$S \sim 100 \text{ g H}_2\text{O} \sim (100+S) \text{ g محلول}$$

مثال ۱: با توجه به نمودار بالا، در دمای 90°C حدود چند گرم پتاسیم کلرید را باید در 400 g آب حل کنیم تا محلول سیرشده آن حاصل شود؟

پاسخ: انحلال پذیری KCl در دمای 90°C ، در حدود 55 g در 100 g آب است. بنابراین:

$$400 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{55 \text{ g KCl}}{100 \text{ g H}_2\text{O}} = 220 \text{ g KCl}$$

مثال ۲: با استفاده از نمودار، در دمای 90°C 62 g محلول سیرشده KCl شامل چند گرم KCl است؟

پاسخ: به ازای هر $(100+55)$ یا 155 g محلول سیرشده، 55 g نمک در محلول وجود دارد. بنابراین:

$$62 \text{ g (محلول)} \times \frac{55 \text{ g KCl}}{155 \text{ g (محلول)}} = 22 \text{ g KCl}$$

مثال ۳: با توجه به نمودار، در دمای 90°C با استفاده از 22 g KCl چند گرم محلول سیرشده آن را می‌توان تهیه کرد؟

پاسخ: در این دما، هر 55 g KCl در 100 g آب حل شده و 155 g محلول سیرشده پدید می‌آورد. بنابراین:

$$55 \text{ g (نمک)} \sim 155 \text{ g (محلول)} \Rightarrow 22 \text{ g (نمک)} \times \frac{155 \text{ g (محلول)}}{55 \text{ g (نمک)}} = 92 \text{ g (محلول)}$$

محاسبه رسوب ته‌نشین شده در محلول سیرشده در اثر تغییر دمای محلول:

اگر انحلال پذیری نمک در دماهای θ_1 و θ_2 ، به ترتیب برابر S_1 و S_2 باشد، به طوری که $\theta_1 > \theta_2$ و $S_1 > S_2$ باشد، در این صورت با تغییر دما از θ_1 به θ_2 ، به ازای هر 100 g آب، به اندازه $(S_1 - S_2)$ گرم نمک ته‌نشین می‌شود.

اگر جرم آب مشخص شده باشد، جرم رسوب حاصل، از ضرب کردن جرم آب در کسر $\frac{S_1 - S_2}{100}$ به دست می‌آید.

اگر جرم محلول مشخص شده باشد، جرم رسوب حاصل، از ضرب کردن جرم محلول در کسر $\frac{S_1 - S_2}{100 + S_1}$ به دست می‌آید.

مثال ۴: در 80 g آب در دمای 90°C به مقدار کافی نمک KCl حل می‌کنیم تا محلول سیرشده آن به دست آید. آن‌گاه دمای محلول را به 60°C می‌رسانیم. چند گرم نمک ته‌نشین می‌شود؟

پاسخ: انحلال پذیری KCl در دماهای 90°C و 60°C به ترتیب 55 g و 45 g در 100 g آب است. بنابراین، به ازای هر 100 g آب، به اندازه اختلاف

انحلال پذیری نمک در دو دما یعنی 10 g رسوب حاصل می‌شود. بنابراین: $(\text{رسوب}) \times \frac{10 \text{ g (رسوب)}}{100 \text{ g H}_2\text{O}} = 8 \text{ g (رسوب)}$ ؛ $80 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{10 \text{ g (رسوب)}}{100 \text{ g H}_2\text{O}} = 8 \text{ g (رسوب)}$ ؛ $100 \text{ g (آب)} \sim 10 \text{ g (رسوب)}$

حل مسئله با استفاده از فرمول: $\text{جرم رسوب حاصل} = \text{جرم آب} \times \frac{S_1 - S_2}{100} = 80 \times \frac{55 - 45}{100} = 8 \text{ g}$

مثال ۵: 62 g محلول سیرشده KCl در دمای 90°C موجود است. اگر دمای محلول را به 60°C برسانیم، چند گرم نمک ته‌نشین می‌شود؟

پاسخ: اگر محلول اولیه $(100+55)$ گرم باشد، به اندازه اختلاف انحلال پذیری نمک در دو دما (یعنی 10 g) رسوب پدید می‌آید. بنابراین:

$$155 \text{ g (محلول)} \sim 10 \text{ g (رسوب)} \Rightarrow 62 \text{ g (محلول)} \times \frac{10 \text{ g (رسوب)}}{155 \text{ g (محلول)}} = 4 \text{ g (رسوب)}$$

حل مسئله با استفاده از فرمول: $\text{جرم رسوب حاصل} = \text{جرم محلول} \times \frac{S_1 - S_2}{100 + S_1} = 62 \times \frac{55 - 45}{100 + 55} = 4 \text{ g}$

مشاوره: آیا در کنکورهای آینده، ممکنه مسائل دیگری با ظاهر متفاوت هم مطرح بشه؟ قطعاً! نوع این مسائل خیلی زیاده و برای رسیدن به تسلط در حل این مسائل، لازمه مسائل خلاقیت‌آمیز زیادی حل کنیم. به یک نمونه در این زمینه توجه کنید:

مثال ۶: در دمای 60°C مقدار 58g گرم محلول سیرشده KCl موجود است. هرگاه 80g گرم آب به محلول اضافه کرده و دمای محلول را به 90°C برسانیم، چند گرم نمک لازم است در محلول حاصل حل کنیم تا محلول سیرشده KCl به دست آید؟ (انحلال پذیری KCl در دماهای 60°C و 90°C به ترتیب 45g و 55g در 100g گرم آب است.)

پاسخ: از 58g محلول اولیه مشخص می‌کنیم که چه مقدار آن آب و چه مقدار آن نمک است:

$$(100 + 45)\text{g (محلول)} \sim 100\text{g (آب)} \Rightarrow 58\text{g (محلول)} \times \frac{100\text{g (آب)}}{145\text{g (محلول)}} = 40\text{g (آب)} \Rightarrow 58 - 40 = 18\text{g (نمک)}$$

با افزودن 80g گرم آب به محلول، مقدار آب به $(40 + 80)$ یا 120g می‌رسد. دما هم به 90°C افزایش داده می‌شود. حالا حساب می‌کنیم در دمای 90°C ،

$$120\text{g (آب)} \times \frac{55\text{g (نمک)}}{100\text{g (آب)}} = 66\text{g (نمک)}$$

چند گرم نمک می‌تواند در 120g آب به صورت محلول باشد:

مقدار 18g گرم نمک در محلول وجود داشته است. بنابراین مقدار نمکی که در محلول حاصل باید حل کنیم تا به حالت سیرشده در آید، برابر است با:
 $66 - 18 = 48\text{g (نمک)}$

۴ نکاتی در مورد نمودار تغییرات انحلال پذیری با تغییر دما:

شکل روبه‌رو، نمایانگر تغییرات انحلال پذیری ماده حل‌شونده X در آب نسبت به تغییر دما است.

۱ به انحلال پذیری ماده در دمای صفر درجه سلسیوس، عرض از مبدأ گفته می‌شود.

با توجه به شکل، مقدار عرض از مبدأ برای انحلال پذیری X برابر 40g در 100g آب است.

۲ معادله انحلال پذیری: این معادله به صورت کلی $S = a + b\theta$ نوشته می‌شود که در آن، S انحلال پذیری،

a عرض از مبدأ و θ دما بر حسب درجه سلسیوس است. b نمایانگر شیب خط یعنی میانگین میزان تغییر انحلال پذیری به ازای هر 1°C افزایش دماست.


با توجه به شکل، با افزایش دما از صفر به 80°C ، انحلال پذیری X به اندازه 40g افزایش می‌یابد،

پس $b = \frac{40}{80} = 0.5$ ، یعنی به ازای هر 1°C افزایش دما، میزان افزایش انحلال پذیری برابر 0.5 گرم است

($b = 0.5$). به این ترتیب، معادله انحلال پذیری ماده X به این صورت خواهد بود: $S = 40 + 0.5\theta$

توجه: اگر با افزایش دما، انحلال پذیری کمتر شود، منحنی نزولی بوده و $b < 0$ خواهد بود.

۳ در این نمودار، نقاط واقع بر منحنی (مانند نقطه B) نمایانگر حالت سیرشده‌اند. نقاط بالاتر از منحنی (مانند نقطه A) نمایانگر حالت فراسیرشده‌اند و نقاطی که پایین‌تر از منحنی قرار دارند (مانند نقطه C) نمایانگر حالت سیرنشده‌اند.




سوالات چهارگزینه‌ای

انحلال پذیری

- مسائل انحلال پذیری + درصد جرمی و ppm: تست‌های ۷۴۳ تا ۷۴۷
- تغییرات انحلال پذیری نمک‌ها با تغییر دما: تست‌های ۷۴۷ تا ۷۶۶

- مفاهیم انحلال پذیری و مسائل مربوط به آن: تست‌های ۷۷۱ تا ۷۷۲
- مسائل انحلال پذیری + غلظت مولار: تست‌های ۷۳۸ تا ۷۴۶
- معادله انحلال پذیری: تست‌های ۷۶۷ تا ۷۷۵

مفاهیم انحلال پذیری و مسائل مربوط به آن



۷۲۱. با توجه به شکل روبه‌رو، چند مورد از مطالب زیر دربارهٔ نمک MX درست است؟ (ریاضی ۹۸)

- در نقطه B ، محلول این نمک، حالت سیرشده دارد.
- نقطه A ، انحلال پذیری این نمک را در دمای 0°C نشان می‌دهد.
- در نقطه D ، حلال می‌تواند مقدار دیگری از این نمک را در خود حل کند.
- در نقطه C ، حلال توانسته است مقدار بیشتر از حد سیر شدن از این نمک را در خود حل کند.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۷۲۲. چه تعداد از عبارات‌های زیر درست است؟


- (آ) از نظر چگالی محلول سیرشده: سدیم نیترات > کلسیم سولفات > باریم سولفات
 (ب) غلظت مولی محلول سیرشده کلسیم فسفات در مقایسه با محلول سیرشده پتاسیم کلرید بیشتر است.
 (پ) اغلب سنگ‌های کلیه از رسوب برخی نمک‌های کلسیم‌دار در کلیه‌ها تشکیل می‌شوند.
 (ت) اگر ماده‌ای بتواند در 1000g گرم آب، بیشتر از یک گرم حل شود، آن را محلول در آب می‌نامند.
 (ث) با افزایش دما، انحلال پذیری همه نمک‌ها افزایش می‌یابد.

۴ (۴)

۳ (۳)


۲ (۲)

۱ (۱)



۷۲۳. ترتیب انحلال پذیری چهار ماده A, B, D, E در دمای ۲۰°C به صورت

- و در دمای ۴۰°C به صورت است.
- (۱) $A > B > E > D, A > E > D > B$
 - (۲) $A < E < B < D, A > D > E > B$
 - (۳) $D > B > E > A, B > D > E < A$
 - (۴) $A > B > D > E, A > D > B > E$



۷۲۴. با توجه به نمودار «انحلال پذیری - دما» برای شماری از ترکیب‌های یونی، اگر تفاوت انحلال پذیری دو نمکی که به ترتیب، بیشترین و کمترین وابستگی را به تغییرات دما دارند، در ۳۰°C، برابر a و در ۵۵°C برابر b در نظر گرفته شود، b - a به تقریب برابر چند گرم است؟

- (۱) ۴۲
- (۲) ۵۵
- (۳) ۶۸
- (۴) ۷۴

اگر مفاهیم انحلال پذیری براتون خوب جا افتاده، حالا می‌توانید چند مسئله در ارتباط با انحلال پذیری محلول‌ها حل کنید:


۷۲۵. انحلال پذیری پتاسیم نیترات در دمای ۴۳°C برابر ۶۱ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. به تقریب، چند مول از این نمک را باید در ۲ لیتر آب حل کرد تا محلول سیرشده آن در این دما به دست آید؟ (چگالی آب برابر 1 g.mL^{-1} است؛ $K=39, O=16, N=14: \text{g.mol}^{-1}$) (ریاضی ۹۷)

- (۱) ۶/۰۴
- (۲) ۱۲/۰۸
- (۳) ۱۸
- (۴) ۲۴

۷۲۶. اگر محلول سیرشده شکر (ساکارز $C_{12}H_{22}O_{11}$) در ۲۵۰ گرم آب در دمای معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر چند گرم و شمار مول‌های ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ (انحلال پذیری ساکارز در این دما، برابر ۲۰۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب است؛ $O=16, C=12, H=1: \text{g.mol}^{-1}$) (ریاضی خارج ۹۸)

- (۱) ۲/۴، ۵۱۲/۵
- (۲) ۲/۴، ۷۶۲/۵
- (۳) ۱/۵، ۷۶۲/۵
- (۴) ۱/۵، ۵۱۲/۵

با توجه به نمودار داده شده به سؤالات ۷۲۷ و ۷۲۸ پاسخ دهید.



۷۲۷. در نیم کیلوگرم آب در دمای ۹۰°C، چند گرم پتاسیم کلرید می‌توان حل کرد و ۶۲ گرم محلول سیرشده این نمک در دمای ۹۰°C، شامل چند گرم KCl است؟

- (۱) ۲۲، ۳۰۰
- (۲) ۲۲، ۲۷۵
- (۳) ۲۸، ۲۷۵
- (۴) ۲۸، ۳۰۰

۷۲۸. در دمای ۹۰°C با استفاده از ۲۲g پتاسیم کلرید، گرم محلول سیرشده این نمک را می‌توان تهیه کرد و اگر پس از تهیه محلول سیرشده، با افزودن آب (در دمای ثابت) جرم محلول را سه برابر کنیم، گرم دیگر پتاسیم کلرید لازم است در محلول حاصل حل کنیم تا به حالت سیرشده در آید.

- (۱) ۶۸/۲، ۶۲
- (۲) ۹۲/۸، ۶۲
- (۳) ۹۲/۸، ۴۸
- (۴) ۶۸/۲، ۴۸

۷۲۹. در محلولی از آلومینیم سولفات که با استفاده از نیم کیلوگرم آب تهیه شده است، ۱۳/۵ گرم یون آلومینیم وجود دارد. اگر انحلال پذیری آلومینیم سولفات در این شرایط، ۶۸/۴ گرم در ۱۰۰ گرم آب باشد، چند گرم دیگر آلومینیم سولفات می‌توان در این محلول حل کرد؟ ($Al=27, S=32, O=16: \text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) ۱۸۴/۶
- (۲) ۲۵۶/۵
- (۳) ۲۷۴/۵
- (۴) ۳۲۸/۵

۷۳۰. در محلولی از مس (II) سولفات که با استفاده از ۴۰۰g آب تهیه شده است، ۱۶ گرم یون مس (II) به صورت محلول وجود دارد. چند گرم دیگر $CuSO_4(s)$ می‌توان در این محلول حل کرد؟ (انحلال پذیری $CuSO_4$ در این شرایط، ۴۰g در ۱۰۰g آب است.) ($Cu=64, S=32, O=16: \text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) ۱۲۰
- (۲) ۱۰۰
- (۳) ۸۴
- (۴) ۹۶

۷۳۱. محلولی از $CaSO_4$ در ۵۰۰ گرم آب در دمای معین، دارای یک گرم یون کلسیم است. چند گرم دیگر $CaSO_4(s)$ در آن حل می‌شود؟ (انحلال پذیری $CaSO_4$ در این شرایط برابر ۱/۰۲ گرم در ۱۰۰ گرم آب است.) ($Ca=40, CaSO_4=136: \text{g.mol}^{-1}$) (تجربی ۹۳)

- (۱) صفر
- (۲) ۱/۵
- (۳) ۱/۲
- (۴) ۴/۱

۷۳۲. انحلال پذیری سدیم کلرید در دمای 25°C برابر ۳۶ گرم است. اگر ۴۱۶ گرم سدیم کلرید را در این دما درون یک کیلوگرم آب بریزیم، چند مورد از مطالب زیر برای تشکیل یک مخلوط سیرشده همگن، درست است؟

(تجربی خارج ۱۳۰۰)

- ۱۵/۵٪ از جرم آغازی حلال، آب اضافه شود.
- ۱۱/۴٪ از جرم محلول موجود، نمک اضافه شود.
- ۱۳/۵٪ از جرم آغازی نمک، از ظرف خارج شود.
- ۷/۵٪ از جرم آغازی نمک، آب از ظرف خارج شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

مسائل انحلال پذیری + درصد جرمی و ppm

۷۳۳. با توجه به داده‌های جدول زیر، چند مورد از عبارتهای مطرح شده درست است؟

فرمول شیمیایی	انحلال پذیری در 1°C	انحلال پذیری در 2°C
NaNO_3	۸۰	۹۶
KCl	۲۸	۳۵
HCl	۷۸	۶۸
KNO_3	۱۸	۴۲

(آ) ۳۶۰ گرم محلول سدیم نیترات در دمای 1°C که ۵٪ جرم آن را آب تشکیل می‌دهد، یک محلول سیرشده است.

(ب) تأثیر دما بر انحلال پذیری پتاسیم کلرید از سه ماده دیگر کمتر است.

(پ) با حل کردن هیدروژن کلرید در آب دمای محلول افزایش می‌یابد.

(ت) اگر ۱۴۲ گرم از محلول سیرشده پتاسیم نیترات را از دمای 2°C تا 1°C سرد کنیم، ۱۸ گرم از جرم محلول کاسته می‌شود.


۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۳۴. در دمای معینی، انحلال پذیری سدیم هیدروکسید برابر ۵۶/۲۵ گرم است. درصد جرمی محلول سیرشده سود در این دما چقدر است؟

۳۰ (۱) ۴۰ (۲) ۳۲ (۳) ۳۶ (۴)

۷۳۵. درصد جرمی NaOH در محلول سیرشده آن در دمای معینی، برابر ۲۲ می‌باشد. انحلال پذیری NaOH در این دما به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

۴۲ (۱) ۳۸ (۲) ۳۴ (۳) ۴۷ (۴)



۷۳۶. غلظت یک نمونه محلول سیرشده از پتاسیم نیترات در دمای $a^{\circ}\text{C}$ پس از سرد شدن تا

دمای $b^{\circ}\text{C}$ ، از ۲۷/۵ به ۱۶/۷ درصد جرمی کاهش می‌یابد. با توجه به شکل مقابل،

(ریاضی خارج ۱۳۰۰)


تفاوت a و b ، برابر چند $^{\circ}\text{C}$ است؟

۴۰ (۱)

۳۰ (۲)

۲۰ (۳)

۱۰ (۴)



۷۳۷. نمودار انحلال پذیری ماده فرضی A به صورت زیر است. اگر محلول سیرشده‌ای با غلظت ۵٪

جرمی از این ماده سرد شود، ۵٪ از ماده حل شده رسوب خواهد کرد. اختلاف دمای اولیه و

ثانویه محلول A برابر چند درجه سانتی‌گراد است؟

۴۳ (۱)

۱۳ (۲)

۳۵ (۳)

۳۰ (۴)

مسائل انحلال پذیری + غلظت مولار

۷۳۸. انحلال پذیری سرب (II) کلرید در دمای معینی برابر ۱۲۹۱/۱- گرم در ۱۰۰ گرم آب است. غلظت محلول سیرشده این ماده در این دما،

(ریاضی ۹۷)

برحسب mol.L^{-1} کدام است؟ (چگالی آب 1g.mL^{-1} است.) ($\text{Pb} = 207/2$ و $\text{Cl} = 35/5\text{g.mol}^{-1}$)

۵ × ۱۰^{-۳} (۱) ۵ × ۱۰^{-۴} (۲) ۵/۷ × ۱۰^{-۳} (۳) ۵/۷ × ۱۰^{-۴} (۴)

۷۳۹. در دمای معینی، انحلال پذیری سدیم هیدروکسید برابر ۲۶ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. در این دما، غلظت مولی محلول سیرشده سود با چگالی

$1/02\text{g.mL}^{-1}$ چند مولار است؟ ($\text{NaOH} = 40\text{g.mol}^{-1}$)

۳/۲۵ (۱) ۴/۷۵ (۲) ۶/۷۵ (۳) ۸/۲۵ (۴)

۷۴۰. در دمای معینی، غلظت مولار محلول سیرشده سود با چگالی ۱/۲۸ گرم بر لیتر برابر ۱۲ مول بر لیتر است. انحلال پذیری NaOH در این دما

چقدر است؟ ($\text{NaOH} = 40\text{g.mol}^{-1}$)

۲۰ (۱) ۳۰ (۲) ۴۵ (۳) ۶۰ (۴)

۱۱۸۳. ۷۲/۵ گرم گاز بوتان، به صورت جداگانه یکبار به صورت ناقص و یکبار به صورت کامل سوزانده می‌شود. تفاوت حجم گاز اکسیژن مصرف شده (پس از تبدیل به شرایط STP) برابر چند لیتر است؟ (از سوختن ناقص هیدروکربن‌ها، گاز کربن مونوکسید و آب تشکیل می‌شود. $(H = 1, C = 12, O = 16 : g.mol^{-1})$)
- (تجربی خارج ۱۴۰۰) ۵۶/۰ (۱) ۶۵/۰ (۲) ۸۶/۹ (۳) ۸۹/۶ (۴)
۱۱۸۴. گاز کربن دی‌اکسید حاصل از سوختن کامل ۲۶ گرم ۲-اتیل هگزان را جمع‌آوری کرده و با کلسیم اکسید واکنش می‌دهیم تا مطابق معادله واکنش اول ۱۰۰٪ باشد، بازده درصدی واکنش دوم چقدر بوده است؟ $(H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40 : g.mol^{-1})$
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۹۵ (۱) ۹۰ (۲) ۸۵ (۳) ۸۰ (۴)
۱۱۸۵. برای سوختن کامل مخلوطی از گازهای هیدروژن و متان به ۸۰ گرم گاز اکسیژن نیاز است و ۲۲/۴ لیتر کربن دی‌اکسید در شرایط STP تولید می‌شود. درصد حجمی متان در مخلوط اولیه کدام است؟ $(O = 16 g.mol^{-1})$
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۴۰ (۱) ۵۰ (۲) ۶۰ (۳) ۷۰ (۴)
۱۱۸۶. ۴۰ مول مخلوط گازهای N_2 و O_2 که ۲۰٪ مولی آن به O_2 تعلق دارد، همراه با یک مول از یک آلکان وارد موتور خودرو می‌شود. اگر گازهای خارج‌شده از موتور، صرفاً شامل CO_2 ، N_2 و H_2O باشد، تعداد مول N_2 در این گازها چند برابر تعداد مول CO_2 است؟ (شبه‌ساز ریاضی خارج ۹۴)
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۳/۴ (۱) ۴/۲ (۲) ۵/۲ (۳) ۶/۴ (۴)
۱۱۸۷. اگر سوختن کامل ۲۰ گرم از یک آلکان با تولید ۴۰ لیتر گاز کربن دی‌اکسید با چگالی ۱/۵۴ گرم بر لیتر همراه باشد، چنانچه بدانیم که در ساختار این آلکان، فقط یک شاخه آلکیل روی زنجیر اصلی وجود دارد، چند ترکیب مختلف را برای این آلکان می‌توان در نظر گرفت؟ $(H = 1, C = 12 : g.mol^{-1})$
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۳ (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴)
۱۱۸۸. مخلوطی از گازهای پروپان و کربن دی‌اکسید موجود است. نیمی از این مخلوط گازی را از روی ۹۲۰ گرم کلسیم اکسید جامد عبور می‌دهیم. در نتیجه ۱۲۵۰ گرم ماده جامد حاصل می‌شود. نیم دیگر مخلوط گازی را با مقدار اضافی گاز اکسیژن وارد واکنش سوختن کامل می‌کنیم. در نتیجه تعداد مول گاز CO_2 در مخلوط، دو برابر می‌شود. در مخلوط گازی اولیه، چند درصد مول‌های گاز به پروپان اختصاص دارد؟ $(C = 12, O = 16 : g.mol^{-1})$
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۱۵ (۱) ۲۵ (۲) ۴۵ (۳) ۷۵ (۴)
۱۱۸۹. ۹۱/۲ گرم ایزواوکتان (C_8H_{18}) را می‌سوزانیم. در اثر سوختن آن، مخلوطی از گازهای CO ، CO_2 و H_2O حاصل می‌شود. اگر گاز CO_2 حاصل را از روی ۷۰۰ گرم MgO عبور دهیم، جرم ماده جامد به ۹۱۱/۲ گرم می‌رسد. در این واکنش چند مول O_2 مصرف شده است؟ $(C = 12, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1})$
- (شبه‌ساز تجربی ۹۹) ۶/۴ (۱) ۹/۲ (۲) ۱۲/۸ (۳) ۱۸/۴ (۴)
۱۱۹۰. مخلوط گازی متشکل از یک آلکان، مقداری CO_2 و ۴ مول O_2 موجود است. هرگاه شرایط لازم برای واکنش سوختن کامل آلکان فراهم شود، و همه اکسیژن موجود در مخلوط نیز به‌طور کامل مصرف شود، مخلوط به‌دست آمده شامل ۲/۶ مول CO_2 و ۲/۲ مول H_2O است. مخلوط گازی اولیه شامل چند مول گاز CO_2 است؟
- (تجربی خارج ۱۴۰۰) ۱/۲ (۱) ۲/۴ (۲) ۳/۲ (۳) ۳/۸ (۴)
۱۱۹۱. اگر در واکنش سوختن اوکتان، $\frac{2}{8}$ اتم‌های کربن به جای تبدیل شدن به کربن دی‌اکسید، به کربن مونوکسید تبدیل شود، مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها کدام است و به ازای مصرف ۲۷ - مول گاز اکسیژن، تفاوت جرم گازهای کربن دی‌اکسید و کربن مونوکسید تشکیل‌شده، به تقریب کدام است؟ $(C = 12, O = 16 : g.mol^{-1})$
- (تجربی خارج تیرا ۱۴۰۰) ۴/۲۳، ۱۵ (۱) ۳/۳۴، ۱۵ (۲) ۴/۲۲، ۱۷ (۳) ۳/۳۴، ۱۷ (۴)

هیدروکربن‌ها - آلکن‌ها، آلکین‌ها و سیکلوآلکان‌ها

۷

صفحه ۳۹ تا ۴۲ کتاب درسی




نخستین عضو خانواده آلکن‌ها

• **اتن:** فرمول مولکولی آن، C_2H_4 و فرمول ساختاری آن به صورت زیر است:
اتن در بیشتر گیاهان وجود دارد.

موز و گوجه‌فرنگی رسیده، گاز اتن آزاد می‌کنند. گاز آزاد شده، به توبه خود موجب رسیدن سریع میوه‌های نارس می‌شود. به همین دلیل در کشاورزی، از گاز اتن به عنوان «عمل آورنده» استفاده می‌شود.


اتن و آلکن‌های دیگر به دلیل داشتن یک پیوند دوگانه ($C=C$)، **سیرنشده** محسوب می‌شوند. زیرا با تفکیک یکی از دو پیوند مربوط به پیوند دوگانه $C=C$ ، هریک از دو اتم کربن مربوط به آن می‌توانند یک اتم هیدروژن یا عواملی دیگر همانند اتم هالوژن‌ها یا گروه هیدروکسیل ($-OH$) را جذب کنند که در این صورت، مولکول حاصل سیرشده خواهد بود.

📖 **مثال:**



برای تولید اتانول در مقیاس صنعتی، از این واکنش استفاده می‌کنند. دقت کنید که سولفوریک اسید (H_2SO_4) در این واکنش، نقش کاتالیزگر را دارد.

واکنش هیدروژن دار شدن آلکن و تبدیل آن به آلکان:



واکنش آلکن با برم:

محلول برم قرمز رنگ است. با انجام واکنش فوق، رنگ قرمز محلول از بین می‌رود. از این واکنش می‌توان برای شناسایی آلکن از هیدروکربن‌های سیر شده استفاده کرد. در صورتی که تکه‌ای از گوشت چرب بتواند در واکنش با بخار برم، موجب جذب برم شده و رنگ آن را از بین ببرد، نتیجه می‌شود که چربی موجود در تکه گوشت، سیر نشده بوده است.

از واکنش‌های مهم و مفید آلکن‌ها، می‌توان از پلیمری شدن آن‌ها نام برد که به‌طور مستقل در فصل آخر کتاب شیمی یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اتین: ساده‌ترین عضو خانواده آلکن‌ها با فرمول مولکولی C_2H_2 است که فرمول ساختاری آن به صورت روبه‌رو است: $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$

برای انجام جوشکاری و برش کاری فلزها، از سوزاندن گاز اتین استفاده می‌شود. سوختن اتین موجب تأمین دمای بالایی می‌شود که برای جوش دادن قطعه‌های فلزی لازم است.

آلکن‌ها همانند آلکن‌ها، واکنش‌پذیری زیادی داشته و با مواد شیمیایی مختلف واکنش می‌دهند.


نام‌گذاری آلکن و آلکین

مراحل نام‌گذاری آلکن‌ها:

۱. انتخاب زنجیر اصلی: به‌طوری است که حتماً شامل هر دو کربنی باشد که پیوند دوگانه بین آن‌ها قرار دارد و تا حد امکان، شامل اتم‌های کربن بیشتری باشد.
 ۲. شماره‌گذاری زنجیر اصلی: از سمتی شروع می‌شود که به پیوند دوگانه نزدیک‌تر است. اگر پیوند دوگانه از دو سر زنجیر اصلی فاصله یکسانی داشته باشد، سمت شماره‌گذاری با توجه به همان قواعد ذکر شده در مورد آلکان‌ها انتخاب می‌شود.

۳. نوشتن نام ترکیب: ابتدا شماره و نام شاخه‌ها به ترتیب حرف اول نام آن‌ها در الفبای انگلیسی ذکر می‌شود و در پایان نام زنجیر اصلی می‌آید (همانند آلکان‌ها)، با این تفاوت که قبل از نام زنجیر اصلی، شماره مشخص کننده موقعیت پیوند دوگانه را ذکر کرده و پسوند «آن» آلکان را هم به پسوند «ین» تغییر می‌دهیم.

دقت کنید: باید شماره کربنی از پیوند دوگانه را ذکر کنید که کوچک‌تر است.



۴، ۳ - دی‌متیل - ۱ - هگزن

مثال ۱:



۱ - برم - ۷، ۷ - دی‌متیل - ۴ - اوگتن

مثال ۲:

در نام‌گذاری آلکن‌ها، کافی است توجه کنید که قواعد همانند آلکن‌هاست، با این تفاوت که به‌جای پسوند «ین» از پسوند «ین» استفاده می‌کنیم. همین!



۵ - برم - ۶ - متیل - ۲ - هپتین




مثال ۳:

استراتژی رسم ایزومرها در خانواده آلکن‌ها و آلکین‌ها

ابتدا با توجه به تعداد کربن و احیاناً شرط عنوان شده، اسکلت‌های کربنی ممکن را (بدون اتم‌های هیدروژن) رسم می‌کنیم و در این مرحله به پیوند دوگانه (یا سه‌گانه) کاری نداریم. سپس ارزیابی می‌کنیم که در هر یک از ساختارهای رسم شده، پیوند دوگانه را در چند موقعیت متفاوت از هم می‌توان قرار داد.

مثال ۱: چند ایزومر ساختاری به فرمول مولکولی C_5H_{10} از خانواده آلکن‌ها می‌توان رسم کرد؟

پاسخ: بدون توجه به پیوند دوگانه، سه ساختار کربنی قابل رسم است:




توجه کنید: در ساختار سمت راستی، ظرفیت کربن وسطی تکمیل شده و امکان وجود پیوند دوگانه نیست. \Rightarrow تعداد ایزومر = $2 + 3 = 5$

استراتژی رسم ایزومرها در آلکن‌ها نیز همانند آلکن‌هاست، با این تفاوت که در ساختارهای کربنی رسم شده، قراردادن پیوند سه‌گانه در موقعیت‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در اینجا باید بیشتر از قبل حواستون به ظرفیت کربن باشد.


■ **آلدهیدهای یک‌عاملی:** با توجه به تعداد کربن در مولکول آلدهید، نام آلکان هم کربن با آن را نوشته و پسوند «ال» را به انتهای نام اضافه می‌کنیم.

🏠 **مثال ۲:**



⚠ **توجه:** از آنجا که در هر آلدهیدی، عامل آلدهیدی در ابتدای زنجیر کربنی واقع شده است، در نام آلدهیدها به ذکر شماره مشخص‌کننده موقعیت عامل آلدهیدی نیازی نیست.

■ **کتون‌های یک‌عاملی:** کافی است به انتهای نام آلکانی، پسوند «ون» افزوده شود. مثال:



■ **اترهای یک‌عاملی:** در مورد اترها، صرفاً نام قدیمی آن‌ها که به سادگی قابل تعیین است، مورد توجه است. به این ترتیب که نام آلکیل‌های متصل به اتم اکسیژن را نوشته و آنگاه، پسوند اتر را می‌آوریم. اگر آلکیل‌ها مثل هم باشند، از نام **دی‌آلکیل اتر** استفاده می‌کنیم.



🏠 **مثال ۳:**


⚠ **توجه کنید:** اگر چه کربوکسیلیک اسیدها و استرها در فصل ۳ شیمی ۲ معرفی می‌شوند، اما بهتر است در همین حد مختصر و مفید، نام‌گذاری آن‌ها را نیز همین‌جا یاد بگیرید؛ البته فقط موارد یک‌عاملی که زنجیر کربنی سیرشده دارند.

■ **کربوکسیلیک اسیدهای یک‌عاملی:** به انتهای نام آلکانی، پسوند «ویک اسید» افزوده می‌شود.



🏠 **مثال ۴:**

■ **استرهای یک‌عاملی:** در ساختار یک استر، همه کربن‌ها متصل به هم نیستند. بنابراین نام هر استری از دو قسمت مستقل از هم تشکیل می‌شود:



پسوند نام: «وات»

🏠 **مثال ۵:**



تعیین تعداد اتم هیدروژن در یک ترکیب آلی پیچیده با فرمول نقطه - خط معین

برای این منظور، شمردن تک‌تک اتم‌های هیدروژن، نه راه دقیقی است و نه راه سریع. به ویژه اینکه در فرمول نقطه - خط یک ترکیب آلی، اتم‌های هیدروژن آن نشان داده نمی‌شوند. پس چکار کنیم؟

راه چاره: از یک فرمول که ضمن سریع بودن، دقیقاً علمی و درست است، استفاده می‌کنیم. اگر تعداد کربن در ترکیب آلی برابر n باشد، می‌توان نوشت:

$$\text{H تعداد اتم} = 2n + 2 - (\text{تعداد پیوند سه‌گانه}) - 4 - (\text{تعداد پیوند دوگانه}) - 2 - (\text{تعداد اتم هالوژن}) - (\text{تعداد اتم نیتروژن}) + 2 = 2n + 2 - 2(1) - 4(1) - 2(2) = 20$$


🏠 **مثال:** تعیین تعداد اتم هیدروژن در ترکیب روبه‌رو:



پاسخ: اول تعداد کربن را با گذاشتن نقطه روی هر اتم کربن مشخص می‌کنیم: می‌شود ۲۰ اتم کربن.

حالا برای تعیین تعداد اتم هیدروژن، می‌رویم سراغ فرمول:

$$\begin{array}{l} \text{تعداد پیوند سه‌گانه} \quad \text{تعداد Cl} \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{H تعداد} = 2(20) + 2 + 4 - 2 - 2(1) - 4(1) - 2(2) = 20 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{تعداد پیوند دوگانه} \quad \text{تعداد N} \end{array}$$



بنابراین اگر بخواهیم فرمول مولکولی ترکیب را بنویسیم، خواهیم داشت:

تعیین فرمول مولکولی عمومی خانواده‌های آلی


اگر ویژگی ساختار خانواده مورد نظر (از نظر تعداد اتم‌های غیر از C و H، تعداد پیوند دوگانه و حلقه و...) مشخص باشد، با تعیین تعداد اتم H می‌توانید فرمول عمومی مربوط به خانواده مورد نظر را تعیین کنید.

مثال ۱: تعیین فرمول مولکولی ترکیب‌های آلی هم خانواده $\text{CH}_n-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ (یعنی آلدهیدها):

$$\text{H تعداد} = 2n + 2 - 2(1) = 2n$$

تعداد پیوند دوگانه

تعداد اتم اکسیژن در آلدهیدها، یک عدد است. اگر تعداد اتم کربن n باشد، تعداد اتم H برابر است با:



بنابراین فرمول مولکولی عمومی آلدهیدهایی که زنجیر کربنی خطی و سیرشده دارند، به این صورت است:

مثال ۲: تعیین فرمول مولکولی ترکیب‌های آلی هم خانواده $\text{CH}_n-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$ (یعنی آمیدها):

در اعضای این خانواده، یک اتم اکسیژن و یک اتم نیتروژن وجود دارد. چنانچه تعداد اتم کربن n باشد، تعداد اتم هیدروژن برابر است با:

$$\text{H تعداد} = 2n + 2 + 1 - 2(1) = 2n + 1$$

تعداد پیوند دوگانه

بنابراین فرمول مولکولی عمومی آمیدهای دارای زنجیر کربنی خطی و سیر شده به این صورت است: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NO}$

با این حساب، فرمول مولکولی همه خانواده‌های آلی که یک گروه عاملی داشته و زنجیر کربنی سیر شده دارند، به راحتی قابل تعیین است. در عین حال، حفظ بودن این فرمول‌ها، حداقل برای سریع‌تر پاسخ دادن به تست‌ها، جزء واجبات است. در این جا فرمول عمومی همه خانواده‌های آلی را می‌آوریم، با این قرض که فقط یک گروه عاملی در ترکیب‌ها وجود دارد و زنجیر کربنی هم سیر شده است:

نام خانواده	فرمول مولکولی عمومی	ساده‌ترین عضو خانواده
آلکان‌ها	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	CH_4 (متان)
آلکن‌ها	C_nH_{2n}	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (اتن)
آلکین‌ها	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$	$\text{CH}\equiv\text{CH}$ (اتین)
الکل‌ها	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$	CH_3-OH (متانول)
اترها	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$	$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ (دی‌متیل اتر)
آلدهیدها	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ (متانال)
کتون‌ها	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$ (استون)
کربوکسیلیک‌اسیدها	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$ (متانوئیک‌اسید)
استرها	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_3$ (متیل متانوآت)
آمین‌ها	$\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$	CH_3-NH_2 (متیل آمین)
آمیدها	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{NO}$	$\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$ (متان آمید)

تعیین تعداد پیوند کووالانسی در یک ترکیب آلی


در ترکیب‌های آلی هر اتم کربن، چهار الکترون، هر اتم هیدروژن، یک الکترون، هر اتم اکسیژن، دو الکترون، هر اتم نیتروژن، سه الکترون و هر اتم هالوژن، یک الکترون را برای تشکیل پیونده مورد استفاده قرار می‌دهد. اگر تعداد کل الکترون‌های پیوندی را حساب کنید، تعداد پیوند کووالانسی برابر نصف آن خواهد بود. به این ترتیب، با توجه به فرمول مولکولی ترکیب آلی، می‌توان تعداد پیوند کووالانسی موجود در هر مولکول از آن را حساب کرد.

سؤالات چهار گزینه‌ای

الکل‌ها، اسیدها و استرها - مسائل

۱۶۶۱. از سوختن کامل الکل حاصل از آبکافت ۹۲/۸ گرم اتیل بوتانوات، چند لیتر گاز کربن دی‌اکسید با چگالی $1/76 \text{ g.L}^{-1}$ تولید می‌شود؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۲. از واکنش ۴/۰ مول پروپانویک‌اسید با مقدار کافی اتانول، چند گرم استر حاصل می‌شود؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۳. اگر در واکنش استری شدن بوتانویک‌اسید با ۱- پروپانول، جرم الکل مصرف شده برابر ۲۴ گرم باشد، چند گرم استر حاصل می‌شود؟
 (با فرض این که بازده واکنش ۸۰٪ باشد).
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۴. در واکنش ۴/۰ گرم از یک کربوکسیلیک‌اسید یک عاملی با زنجیر کربنی سیرشده با مقدار کافی ۲- پروپانول، ۴/۰ مول استر تولید شده است. تعداد پیوند کووالانسی در هر مولکول از اسید مصرف شده و نیز هر مولکول از استر تولیدشده، به ترتیب کدام است؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۵. از آبکافت مقداری از یک استر، ۲/۰ مول ۱- پروپانول و ۱۷/۶ گرم از یک کربوکسیلیک‌اسید یک عاملی با زنجیر کربنی سیرشده به دست می‌آید. هر مولکول از این استر شامل چند اتم است؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۶. ۴/۰ مول از یک استر به فرمول مولکولی $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}_2$ را آبکافت می‌کنیم. هر مولکول الکل حاصل دارای ۱۷ پیوند اشتراکی است. اگر اسید تولید شده را بر فلز منیزیم اثر دهیم، چند گرم ترکیب منیزیم‌دار حاصل می‌شود؟ $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{Mg} = 24: \text{g.mol}^{-1})$ (شبه‌ساز تجربی خارج ۹۹)
۱۶۶۷. حجم گاز CO_2 حاصل از سوختن ۱۱۱ گرم از یک الکل یک عاملی سیرشده در شرایط STP برابر ۱۲۴/۴ لیتر است. فرمول مولکولی این الکل به چند ایزومر الکلی متفاوت از هم می‌تواند نسبت داده شود؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۸. مقدار ۵۱ گرم پنتانویک‌اسید را با مقدار کافی متانول در واکنش استری شدن شرکت می‌دهیم. اگر بازده واکنش انجام‌شده، ۸۰٪ باشد، اختلاف جرم استر تولیدشده با آب تولیدشده از این واکنش، چند گرم است؟
 $(\text{O} = 16, \text{C} = 12, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$
۱۶۶۹. در واکنش اتانول و استیک‌اسید در محیط اسیدی، به تقریب چند درصد جرمی از فرآورده‌های واکنش را ترکیب آلی تشکیل می‌دهد؟
 $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1})$ (ریاضی ۹۴)
۱۶۷۰. اگر از آبکافت استری با فرمول مولکولی $\text{C}_9\text{H}_8\text{CO}_2$ ، بوتانول تشکیل شود، فرمول شیمیایی کربوکسیلیک‌اسید تشکیل‌شده کدام است و برای تشکیل ۲۹ گرم از این اسید، چند گرم از این استر باید در شرایط مناسب آبکافت شود؟ $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1})$ (ریاضی خارج تیر ۱۳۰۱)
۱۶۷۱. ۵/۱ گرم از ماده اصلی تولیدکننده بوی نوهی میوه در شرایط مناسب در محیط اسیدی با آب واکنش داده و ترکیب A را به همراه ۸/۰ گرم متانول تولید می‌کند. در صورتی که بازده واکنش برابر ۵۰ درصد باشد، جرم مولکولی ماده A و فرمول مولکولی ماده اولیه کدام است؟
 (تجربی ۹۹)
- $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1})$
 $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{A} + \text{CH}_3\text{OH}$
۱۶۷۲. استری که از آبکافت یک نمونه از آن، ۲/۰ مول اتانول و ۱۷/۶ گرم از یک کربوکسیلیک‌اسید حاصل می‌شود، با کدام ترکیب زیر ایزومر است؟ $(\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g.mol}^{-1})$ (شبه‌ساز تجربی ۹۹)
۱۶۷۳. گرم اثر آب بر گرم ترکیب آلی به فرمول مولکولی ۱/۲ مول اتیلن گلیکول و ۲۱۲ گرم ترکیبی از خانواده کربوکسیلیک اسیدها (با زنجیر کربنی سیرشده) حاصل می‌شود؟ (بازده واکنش را ۶۰٪ در نظر بگیرید). $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{N} = 14, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1})$

۱۶۷۴. مقدار گاز کربن دی‌اکسید تولیدشده از سوختن کامل ۲۵۵ گرم از یک الکل سیرشده یک هاملی با مقدار گاز کربن دی‌اکسید تولیدشده،



۱۶۷۵. اگر H_2O حاصل از واکنش سوختن کامل ۵۱ گرم از یک کربوکسیلیک‌اسید (با زنجیر کربنی سیرشده) را بر ۵۵ گرم محلول ۰/۶٪ سود اثر دهیم، محلول ۰/۲۲٪ جرمی سود حاصل می‌شود. از اثر دادن ۰/۸ مول از این کربوکسیلیک‌اسید بر مقدار کافی (۱- پروپانول، چند گرم استر حاصل می‌شود؟ $(Na = ۲۳, O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱: g.mol^{-1})$



۱۶۷۶. مقداری از یک کربوکسیلیک‌اسید را به‌طور کامل می‌سوزانیم. H_2O تولیدشده در این واکنش، برابر مقدار آب موجود در ۲۵۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۵۵٪ جرمی سود با چگالی ۱/۶ گرم بر میلی‌لیتر است. برای جذب گاز کربن دی‌اکسید تولیدشده در این واکنش، چند گرم MgO مصرف می‌شود؟ $(Mg = ۲۴, Na = ۲۳, O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱: g.mol^{-1})$



ویتامین سرا

۵

صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ کتاب درسی



❖ **ویتامین A:** فرمول ساختاری ویتامین A به صورت مقابل است:

■ فرمول مولکولی: $C_{20}H_{30}O$

■ دارای یک عامل الکلی $-OH$ است.

■ بخش ناقطبی مولکول، کاملاً بر بخش قطبی آن غلبه دارد. به همین دلیل، در آب

حل نمی‌شود، اما در حلال‌های ناقطبی، چربی و روغن می‌تواند حل شود.

■ با خوردن آب هویج، ویتامین A مورد نیاز بدن تأمین می‌شود.

■ به دلیل نامحلول بودن ویتامین A در آب، خوردن بیش از اندازه آن برای بدن مشکل ایجاد می‌کند.

در مورد ویتامین A، با توجه به این که ۲۰ اتم کربن دارد، خواهیم داشت:

$$H \text{ تعداد} = 2(20) + 2 - 2(1) - 2(5) = 30$$

← تعداد کربن
↓ تعداد حلقه
→ تعداد پیوند دوگانه

پس فرمول مولکولی آن $C_{20}H_{30}O$ می‌باشد.

❖ **ویتامین C:** فرمول ساختاری این ویتامین به صورت زیر است:

■ فرمول مولکولی: $C_6H_8O_6$

■ دارای ۴ عامل الکلی و یک عامل استری است.

■ بخش قطبی مولکول (عامل‌های الکلی و استری) بر بخش ناقطبی آن، غلبه دارد. به همین دلیل در

آب حل می‌شود، اما در حلال‌های ناقطبی، مانند چربی و روغن حل نمی‌شود.

■ به دلیل محلول بودن ویتامین C در آب، خوردن بیش از اندازه آن برای بدن مشکل ایجاد نمی‌کند.

■ پرتقال و سایر انواع مرکبات، منبعی غنی برای تأمین ویتامین C هستند.

■ محاسبه تعداد پیوند کووالانسی در مولکول ویتامین C: تعداد پیوند کووالانسی برابر با نصف تعداد الکترون‌های پیوندی است. هر اتم C، O، H، به ترتیب دارای ۴، ۶ و ۱ الکترون پیوندی است. بنابراین:

$$\text{تعداد الکترون پیوندی} = \frac{1}{2} \times [(6 \times 4) + (8 \times 1) + (6 \times 2)] = 22$$

❖ **ویتامین D:** فرمول ساختاری ویتامین D به صورت روبرو است:

■ فرمول مولکولی: $C_{28}H_{44}O$

■ دارای یک عامل الکلی $(-OH)$ است.

■ بخش قطبی مولکول (عامل $-OH$) در مقایسه با بخش ناقطبی مولکول (قسمت

هیدروکربنی) خیلی کوچک‌تر است. بنابراین بخش ناقطبی بر بخش قطبی کاملاً غلبه داشته و

موجب می‌شود قطبیت مولکول نزدیک به صفر باشد. به همین دلیل، ویتامین D در آب (حلال

قطبی) حل نشده و در عوض، در حلال‌های ناقطبی مانند روغن و چربی به خوبی حل می‌شود.

■ به دلیل نامحلول بودن ویتامین D در آب، خوردن بیش از اندازه آن برای بدن مشکل ایجاد می‌کند.

■ شیر یکی از مواد غذایی است که حاوی ویتامین D است.






۱۷۶۹. اختلاف تعداد پیوند کووالانسی الکل و اسید سازنده پلی استر روبه‌رو چقدر است؟

- (۱) صفر
(۲) ۲
(۳) ۴
(۴) ۶

۱۷۷۰. در واحد تکرار شونده پلی استر حاصل از واکنش دو ترکیب زیر، چند اتم وجود دارد؟




- (۱) ۳۶
(۲) ۳۸
(۳) ۴۰
(۴) ۴۲

(شبهه سال تجزیه خارج ۹۹)

۱۷۷۱. کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) انحلال پذیری ۱- بوتانول در آب، بیشتر از ۱- پنتانول و اتان است.
(۲) استون همانند اتانول، به هر نسبتی در آب حل می‌شود.
(۳) تعداد اتم در ساده‌ترین مولکول خانواده کتون‌ها، دو برابر تعداد اتم در ساده‌ترین مولکول خانواده کربوکسیلیک اسیدها است.
(۴) نیروی جاذبه غالب بین مولکولی در همه الکل‌ها، پیوند هیدروژنی است.


۱۷۷۲. در مورد آمیدی با فرمول ساختاری روبه‌رو، چه تعداد از عبارات‌های ارائه شده درست است؟



- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

- (آ) اسید سازنده آن ایزومر اتیل بوتانوات است.
(ب) آمین سازنده آن ۱۵ پیوند کووالانسی دارد.
(پ) در ساختار مولکول آن، ۲۰ پیوند C-H وجود دارد.
(ت) در حدود ۷۰٪ از جرم آن را کربن تشکیل می‌دهد.

۱۷۷۳. واحد تکرار شونده پلی آمید حاصل از واکنش دو ترکیب زیر، شامل چند اتم است؟



- (۱) ۵۰
(۲) ۵۲
(۳) ۵۴
(۴) ۵۶

۱۷۷۴. چه تعداد از عبارات‌های زیر درست است؟

- (آ) از اتیل بوتانوات می‌توان در صنعت برای تولید شوینده با بوی آناناس استفاده کرد.
(ب) برخی پلیمرهای طبیعی مانند پشم گوسفند و شاخ حیوانات، شامل گروه عاملی آمیدی هستند.
(پ) بوی زننده ماهی به دلیل وجود متیل آمین و برخی آمین‌های دیگر است.
(ت) کولار پلی آمیدی ساختگی است که از فولاد هم جرم خود، پنج برابر مقاوم تر است.
(ث) پلی استرها و پلی آمیدها برخلاف پلیمرهای حاصل از هیدروکربن‌های سیرنشده، در طبیعت ماندگار بوده و تجزیه نمی‌شوند.

- (۱) ۲
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) ۵

۱۷۷۵. ۲/۱ - مول از استری را با مقداری کافی آب در حضور سولفوریک اسید آبکافت می‌کنیم. در نتیجه ۲/۱ - مول اتانول و ۱۷/۶ گرم از یک کربوکسیلیک اسید با

زنجر کربنی سیرشده حاصل می‌شود. هر مولکول از این استر دارای چند اتم هیدروژن است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1; g.mol^{-1}$)


- (۱) ۱۰
(۲) ۱۲
(۳) ۱۴
(۴) ۱۶

آزمون عبارات فصل ۳ یازدهم



از میان عبارات‌های زیر، ۱۶ مورد نادرست است. آن‌ها را بیابید!

۱. سلولز همانند نشاسته از پلیمر شدن گلوکز پدید می‌آید.
۲. در مورد هر پلیمری، جرم مولی پلیمر با مجموع جرم مولی مونومرهای سازنده پلیمر برابر است.
۳. اتن ترکیبی سیرنشده است، در حالی که پلی اتن سیرشده به‌شمار می‌آید.
۴. ساختار پلی پروپن را می‌توان به‌صورت زیر نمایش داد:



۵. پلی سیانواتن در تهیه پتو و پلی پروپن در تهیه سرنگ کاربرد دارد.
۶. واحد تکرار شونده پلیمری که از آن برای تهیه ظروف یکبار مصرف استفاده می‌شود، شامل ۱۶ اتم است.
۷. مونومرهای سازنده تفلون و پلی وینیل کلرید دارای تعداد اتم یکسانی هستند.
۸. پلی اتن شاخه‌دار، شفاف بوده و چگالی و استحکام آن در مقایسه با پلی اتن بدون شاخه کمتر است.



تغییر pH محلول در اثر رقیق شدن آن



در مورد برخی از مباحث مرتبط با pH مانند تغییر pH محلول در اثر رقیق شدن آن، و تعیین pH محلول حاصل از مخلوط شدن چند محلول با یکدیگر، در کتاب درسی نه مطلبی آمده و نه پرسشی مطرح شده است. اما طرح تست در ارتباط با این مباحث در کنکور غیرممکن نیست. به هر حال، ترجیح می‌دهیم که ده دوازده تست از این موضوعات هم ارائه کنیم تا احياناً در جلسه کنکور، غافلگیر نشوید. علاوه بر آن، حل این تست‌ها یکی از بهترین روش‌ها برای تسلط یافتن بر مبحث pH و مسائل متنوع مربوط به آن است.

۲۰۴۲. اگر حجم یک نمونه محلول HCl با غلظت 0.1 mol.L^{-1} با افزودن آب مقطر به آن، دو برابر شود، pH آن (ریاضی خارج ۸۷)

- (۱) نصف می‌شود (۲) دوبرابر می‌شود (۳) 0.30 واحد افزایش می‌یابد (۴) 0.20 واحد افزایش می‌یابد

۲۰۴۳. اگر به 50 میلی‌لیتر محلول نیتریک‌اسید با $\text{pH} = 1$ ، 200 میلی‌لیتر آب اضافه کنیم، pH محلول جدید چقدر خواهد بود؟

- (۱) $1/3$ (۲) $1/7$ (۳) $2/3$ (۴) $2/7$

۲۰۴۴. محلولی از هیدروکلریک‌اسید با $\text{pH} = 2$ موجود است. اگر به اندازه چهار برابر حجم این محلول به آن آب اضافه کنیم، pH محلول رقیق شده چقدر خواهد بود؟

- (۱) $2/6$ (۲) $2/7$ (۳) $2/9$ (۴) $3/3$

۲۰۴۵. 40 میلی‌لیتر محلول سود با $\text{pH} = 12$ موجود است. اگر با افزودن آب، حجم این محلول را به 160 میلی‌لیتر برسانیم، pH محلول رقیق شده چقدر خواهد بود؟

- (۱) $12/4$ (۲) $12/6$ (۳) $12/4$ (۴) 12

۲۰۴۶. 20 میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک‌اسید با $\text{pH} = 1/2$ موجود است. چند میلی‌لیتر آب باید به این محلول اضافه کنیم تا pH محلول به 3 برسد؟

- (۱) 180 (۲) 200 (۳) 980 (۴) 1000

۲۰۴۷. به 50 mL محلول نیتریک‌اسید با $\text{pH} = 1$ چند میلی‌لیتر آب باید افزوده شود تا pH محلول برابر 2 شود؟

- (۱) 450 (۲) 4500 (۳) 4950 (۴) 495

۲۰۴۸. به 700 میلی‌لیتر آب چند میلی‌لیتر محلول هیدروکلریک‌اسید با $\text{pH} = 1/7$ باید اضافه کنیم تا محلولی با $\text{pH} = 2/6$ به دست آید؟

- (۱) 50 (۲) 100 (۳) 300 (۴) 500

۲۰۴۹. به 150 میلی‌لیتر آب، چند میلی‌لیتر محلول سود با $\text{pH} = 13/7$ باید افزوده شود تا $\text{pH} = 12/5$ گردد؟

- (۱) 5 (۲) 10 (۳) 20 (۴) 40

۲۰۵۰. به 10 میلی‌لیتر محلول سود با $\text{pH} = 12$ چند میلی‌لیتر آب اضافه کنیم تا pH محلول حاصل برابر $12/3$ گردد؟

- (۱) 40 (۲) 50 (۳) 80 (۴) 100

۲۰۵۱. اگر به حجم معینی از محلول 0.2 M مولار سدیم‌هیدروکسید، همان حجم آب مقطر اضافه شود، pH آن از به می‌رسد که برابر pH محلول مولار آن است. (ریاضی ۸۹)

- (۱) $0.1, 1.3, 1.3, 3$ (۲) $0.1, 1.2, 7.1, 3, 7$ (۳) $0.1, 1.2, 3.1, 3, 3$ (۴) $0.1, 1.2, 7.1, 3, 7$

۲۰۵۲. 500 میلی‌لیتر محلول HCN با غلظت 0.1 M مولار در دمای اتاق وجود دارد. اگر در دمای ثابت، با افزودن آب حجم محلول را به 50 لیتر برسانیم، pH محلول چند واحد تغییر می‌کند؟ (در دمای اتاق، ثابت یونش HCN را 4×10^{-10} در نظر بگیرید.)

- (۱) 0.4 (۲) 0.7 (۳) 1 (۴) 1.3

۲۰۵۳. با افزودن 10 میلی‌لیتر از محلول یک ترکیب با خاصیت اسیدی قوی (HA) به 90 میلی‌لیتر آب مقطر، pH محلول به 2 کاهش می‌یابد. برای خنثی شدن کامل هر لیتر از محلول غلیظ اولیه این ترکیب اسیدی، چند گرم NaOH(s) لازم است؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) 1 (۲) 4 (۳) 10 (۴) 40 (تجربی ۹۷)

۲۰۵۴. اگر به محلول 0.2 M مولار یک اسید قوی تک‌پروتون‌دار، 9 برابر حجم آن آب مقطر اضافه شود، pH آن چند واحد تغییر می‌کند و درصد یونش محلول 0.1 M مولار اسید ضعیف HA باید کدام عدد باشد تا pH آن با pH نهایی اسید قوی برابر شود؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.) (تجربی دی ۱۴۰۱)

- (۱) $20, 1$ (۲) $20, 1/5$ (۳) $4, 1$ (۴) $4, 1/5$

۲۰۵۵. به 200 میلی‌لیتر محلول اسید HA با $K_a = 10^{-7}$ و $\text{pH} = 4$ ، چند میلی‌لیتر آب (در دمای ثابت) لازم است اضافه کنیم تا pH محلول به $4/2$ برسد؟

- (۱) 200 (۲) 400 (۳) 600 (۴) 800


۲۰۵۶. در دمای ثابت، اگر غلظت آغازی یک اسید تک‌پروتون‌دار ($K_a = 2/5 \times 10^{-8}$) را در آب افزایش دهیم تا غلظت آن در حالت تعادل، 25 برابر شود، تغییر درجه یونش اسید نسبت به حالت آغازی، به تقریب چند درصد بوده و pH محلول، چند واحد نسبت به محلول آغازی، تغییر می‌کند؟ (تجربی خارج ۱۴۰۰)

- (۱) $0.3, 2.0$ (۲) $0.7, 2.0$ (۳) $0.3, 8.0$ (۴) $0.7, 8.0$

مقایسه قدرت کاهندگی یا اکسندگی گونه‌های شیمیایی با توجه به مقدار E°



۲۲۱۲. با توجه به داده‌های زیر، از میان فلزهای V, Cd, Cu, Pt و فلز کاهنده قوی‌تر است و می‌تواند را از محلول نمک‌های آن آزاد سازد.



(۱) V ، کادمیم، نیکل (۲) V ، مس، نیکل (۳) Cu ، نیکل، مس (۴) Cu ، وانادیم، کادمیم

۲۲۱۳. با توجه به اینکه واکنش: $Ni(s) + Mn^{2+}(aq) \rightarrow Ni^{2+}(aq) + Mn(s)$ انجام پذیر نیست، چه تعداد از عبارات‌های زیر درست است؟

(آ) E° الکتروود منگنز از E° الکتروود نیکل بزرگ‌تر است.

(ب) فلز نیکل در مقایسه با فلز منگنز، کاهنده قوی‌تری است.

(پ) واکنش: $Ni^{2+}(aq) + Mn(s) \rightarrow Ni(s) + Mn^{2+}(aq)$ انجام پذیر است.

(ت) یون Ni^{2+} اکسندگی‌تر از یون Mn^{2+} است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۲۱۴. با توجه به مقادیر E° ارائه شده، از میان گونه‌های شیمیایی $Ag^+, I_2, Mg^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}$ قوی‌ترین اکسندگی و ضعیف‌ترین اکسندگی، به ترتیب (از راست به چپ) کدام‌اند؟




(۱) Cu^{2+}, Mg^{2+} (۲) Mg^{2+}, Ag^+ (۳) Mg^{2+}, I_2 (۴) Zn^{2+}, Ag^+

۲۲۱۵. با توجه به مقادیر E° ارائه شده، از میان گونه‌های A^+, B^{2+} و D^{2+} کدام یک قوی‌ترین اکسندگی و از میان گونه‌های E و G کدام یک قوی‌ترین کاهندگی است؟



(۱) E, D^{2+} (۲) E, A^+ (۳) G, B^{2+} (۴) G, A^+

۲۲۱۶. با توجه به مقادیر E° داده شده، از میان گونه‌های شیمیایی $Ag, Br^-, Mg^{2+}, Fe^{2+}$ کدام یک اکسندگی قوی‌تر و کدام یک، کاهندگی قوی‌تری است؟ (به ترتیب، از راست به چپ)



(۱) Ag, Br^- (۲) Mg^{2+}, Br^- (۳) Fe^{2+}, Fe^{3+} (۴) Br^-, Mg^{2+}

۲۲۱۷. نیروی الکتروموتوری (E°) واکنش: $M(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow M^{2+}(aq) + 2Ag(s)$ ، برابر $+1/56$ ولت و E° الکتروود نقره برابر $+0.80$ ولت

است. E° الکتروود فلز M ، برابر ولت است و کاتیون $Ag^+(aq)$ ، از کاتیون $M^{2+}(aq)$ است. (ریاضی ۹۸)

(۱) -0.4 ، کاهنده‌تر (۲) $+0.4$ ، اکسندگی‌تر (۳) -0.76 ، کاهنده‌تر (۴) -0.76 ، اکسندگی‌تر

تعیین انجام پذیر بودن واکنش‌های اکسایش - کاهش با توجه به مقادیر E°



۲۲۱۸. در کدام مورد، واکنش خودبه‌خودی انجام می‌گیرد و فرآورده رنگی تولید می‌شود؟

(۱) ریختن محلول هیدروکلریک اسید روی یک صفحه مسی (۲) وارد کردن یک میله آهنی در محلول پتاسیم نیترات

(۳) ریختن گرد روی در محلول نقره سولفات (۴) وارد کردن گاز کلر در محلول سدیم برمید


۲۲۱۹. کدام واکنش انجام نمی‌گیرد؟ (با توجه به مقادیر E° ارائه شده)




(۱) $Zn + 2Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2Ag$ (۲) $Cu^{2+} + Sn \rightarrow Cu + Sn^{2+}$

(۳) $2Ag + I_2 \rightarrow 2Ag^+ + 2I^-$ (۴) $2I^- + Br_2 \rightarrow I_2 + 2Br^-$


۲۲۲۰. با توجه به مقادیر E° ارائه شده، کدام واکنش می تواند انجام گیرد؟



۲۲۲۱. چه تعداد از واکنش های اکسایش - کاهش زیر با توجه به مقادیر E° ارائه شده قابل انجام است؟



۲۲۲۲. با توجه به مقادیر E° ارائه شده، کدام واکنش انجام نمی گیرد؟




۲۲۲۳. با توجه به جدول زیر، چه تعداد از عبارات ارائه شده درست است؟

ا) قدرت کاهندگی D در مقایسه با A، B و C^{2+} ، بیشتر است.
 ب) قدرت اکسندگی A^+ ، در مقایسه با B^{2+} ، C^{2+} و D^{2+} ، بیشتر است.
 پ) C^{2+} را با استفاده از هر یک از گونه های A^+ و B^{2+} می توان اکسید کرد.
 ت) واکنش یون A^+ با D به طور طبیعی انجام پذیر نیست.

۲ (۲) ۱ (۱)
۴ (۴) ۳ (۳)

۲۲۲۴. در چهار ظرف شماره (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، حاوی هیدروکلریک اسید (۱- مولار با دمای 30°C ، چهار تیغه فلزی به ترتیب B، A، D و E را قرار دادیم. با توجه به مقادیر ارائه شده از E° ، پس از گذشت چند دقیقه، کدام ترتیب برای مقایسه دمای محلول ها درست است؟




۲۲۲۵. با توجه به قدرت کاهندگی فلزهای ارائه شده، چه تعداد از عبارات زیر نادرست است؟


ا) روی اکسید شونده تر (کاهنده تر) از آهن است، به همین دلیل می توان محلول حاوی $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ را در ظرفی از جنس روی نگهداری کرد.
 ب) یون Cu^{2+} اکسندگی قوی تری نسبت به یون Zn^{2+} است و می توان محلول حاوی یون های $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ را در ظرف مسی نگهداری کرد.
 پ) $E^\circ_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}$ کوچکتر از $E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}}$ است، پس می توان محلول حاوی Fe^{2+} را در ظرف آلومینیومی نگهداری کرد.
 ت) قدرت کاهندگی آلومینیم بیشتر از مس است، پس می توان محلول حاوی Al^{3+} را در ظرف مسی نگهداری کرد.

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

(شبهه نماز تجزیه خارج ۹۹)

۲۲۲۶. با توجه به مقادیر E° نیم واکنش های زیر، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟





۲۴۶۰. شکل مقابل شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی را نشان می‌دهد. شاره A شامل و محفظه B شامل است.

- (۱) سدیم کلرید مذاب - بخار آب داغ
- (۲) گاز نیتروژن - بخار آب داغ
- (۳) سدیم کلرید مذاب - گاز نیتروژن
- (۴) گاز نیتروژن - سدیم کلرید

۲۴۶۱. گستره دمایی که در آن، ماده به حالت مایع است، در کدام گزینه درست مقایسه شده است؟ (بر اساس داده‌های صفحه ۷۸ کتاب شیمی ۳)

- (۱) $NaCl > H_2O > HF > N_2$
- (۲) $Cu > NaCl > H_2O > O_2$
- (۳) $Cu > HF > NaCl > N_2$
- (۴) $NaCl > Cu > HF > H_2O$

(ریاضی دی ۱۴۰۱)


۲۴۶۲. کدام ماده در حالت مایع انرژی گرمایی را بیشتر نگه می‌دارد؟

- (۱) پتاسیم کلرید
- (۲) آب
- (۳) نیتروژن
- (۴) هیدروژن کلونوئید

۴ جامد یونی


صفحه ۷۷ تا ۸۱ کتاب درسی

ساختار ذره‌ای جامد یونی



جامد یونی از یون‌های مثبت و منفی تشکیل شده است که با نظم خاصی در سه بُعد کنار هم چیده شده‌اند، به گونه‌ای که یون‌های ناهمنام کنار هم قرار گیرند و یون‌های همنام تا جای ممکن، از یکدیگر فاصله داشته باشند. اگر یک اتم فلزی مثل Na با یک اتم نافلزی مانند Cl وارد واکنش با یکدیگر شوند، اتم فلزی الکترون از دست داده و به کاتیون تبدیل می‌شود. در مقابل، اتم نافلزی با گرفتن الکترون آزاد شده از اتم فلزی، به آنیون تبدیل می‌شود. جاذبه‌ای که میان کاتیون‌ها و آنیون‌ها در شبکه بلور یونی پدید می‌آید، به پیوند یونی موسوم است. این جاذبه میان هر یون با تمام یون‌های واقع در اطراف آن در شبکه یونی برقرار می‌شود.

همواره شعاع یونی کاتیون یک عنصر از شعاع اتمی آن عنصر کوچک‌تر و شعاع یونی آنیون یک عنصر از شعاع اتمی همان عنصر بزرگ‌تر است. در شکل زیر این موضوع در واکنش اتم‌های Na و Cl برای تشکیل سدیم کلرید، به وضوح دیده می‌شود.



در شبکه یونی، نیروی دافعه میان یون‌های همنام نیز وجود دارد، ولی نیروهای جاذبه میان یون‌های ناهمنام بر نیروهای دافعه بین یون‌های همنام غالب است.

به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام موجود پیرامون هر یون در شبکه بلور، عدد کوئوردیناسیون می‌گویند. در شبکه بلور یونی سدیم کلرید، عدد کوئوردیناسیون هریک از یون‌های Na^+ و Cl^- برابر «۶» است.


همه چیز درباره سدیم کلرید

- سدیم کلرید ($NaCl$) ترکیب یونی سفید رنگی است که در واقع، همان نمک خوراکی است.
- سدیم کلرید طی یک واکنش شدید و گرماده از واکنش فلز سدیم با گاز کلر حاصل می‌شود.
- اتم Na با از دست دادن یک الکترون به یون Na^+ تبدیل شده و به آرایش گاز نجیب دوره قبل از خود (Ne) می‌رسد و اتم Cl با گرفتن یک الکترون به یون Cl^- تبدیل شده و به آرایش گاز نجیب هم‌دوره خود (Ar) می‌رسد.
- شعاع یونی Na^+ کمتر از شعاع اتم Na و شعاع یونی Cl^- بیشتر از شعاع اتم Cl است.
- سدیم کلرید همانند دیگر ترکیب‌های یونی، در گستره دمایی بزرگی به حالت مایع است (از نقطه ذوب یعنی $801^\circ C$ تا نقطه جوش یعنی $1413^\circ C$). به همین دلیل در فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، از سدیم کلرید مذاب به عنوان شارهای جهت ذخیره کردن انرژی گرمایی استفاده می‌شود.


■ عدد کوئوردیناسیون هریک از یون‌های Na^+ و Cl^- در شبکه بلور یونی سدیم کلرید برابر ۶ است.

■ انرژی فروپاشی شبکه بلور سدیم کلرید، معادل ΔH واکنش روبه‌رو است: $NaCl(s) \rightarrow Na^+(g) + Cl^-(g) \quad \Delta H = +787 kJ \cdot mol^{-1}$


۲۷۰۵. در واکنش تعادلی: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g), \Delta H < 0$ ، کدام موارد سبب جابه‌جا شدن تعادل در جهت رفت می‌شود؟ (تجربی ۱۷)
- (آ) افزایش فشار (ب) افزایش دما (ث) وارد کردن اکسیژن اضافی به واکنش‌گاه (۴) ب، پ، ث
- (۱) آ، ب (۲) آ، ث (۳) ب، پ، ث



۲۷۰۶. با توجه به نمودار روبه‌رو، در تعادل اولیه مربوط به واکنش: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g) + q$ ، چه تغییری اعمال شده است؟
- (۱) کاهش دما (۲) افزایش دما (۳) کاهش حجم (۴) افزایش حجم



۲۷۰۷. نمودار روبه‌رو تغییر غلظت مولی فراورده را برای واکنش تعادلی $A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g)$ در دو شرایط مختلف نشان می‌دهد. این واکنش است و فشار P_2 در مقایسه با فشار P_1 ، است. (صفحه ۱۱۰ کتاب شیمی ۳ - فصل ۴ - خود را بیازمایید شماره ۲)
- (۱) گرماگیر - بزرگ‌تر (۲) گرماگیر - کوچک‌تر (۳) گرماده - بزرگ‌تر (۴) گرماده - کوچک‌تر



۲۷۰۸. با توجه به نمودار روبه‌رو، تغییر اعمال شده بر تعادل: $N_2(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + q$ کدام است و تعادل در چه جهتی جابه‌جا شده است؟
- (۱) افزایش فشار - رقت (۲) کاهش فشار - برگشت (۳) افزایش دما - برگشت (۴) کاهش دما - رقت

۲۷۰۹. واکنش تعادلی گازی: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ در اثر افزایش دما و افزایش حجم به سمت چپ پیشرفت می‌کند. چه رابطه‌ای بین ضرایب‌های a, b, c و d وجود دارد و واکنش رفت گرماده است یا گرماگیر؟
- (۱) $a + b < c + d$ ، گرماده (۲) $a + b > c + d$ ، گرماده (۳) $a + b < c + d$ ، گرماگیر (۴) $a + b > c + d$ ، گرماگیر

(ریاضی خارج ۱۳)

۲۷۱۰. کدام مطلب، درباره تعادل‌های شیمیایی درست است؟

- (۱) اگر با افزایش دما، ثابت تعادل واکنش بزرگ‌تر شود، آن واکنش گرماگیر است.
 (۲) در دمای ثابت، تغییر شرایط (غلظت، فشار، حجم) بر میزان پیشرفت واکنش تعادلی بی‌تأثیر است.
 (۳) افزایش غلظت واکنش‌دهنده‌ها و کاهش غلظت فراورده‌ها در دمای ثابت، ثابت تعادل را افزایش می‌دهد.
 (۴) بر پایه اصل لوشاتلیه، وارد کردن گاز بی‌اثر به مخلوط واکنش، تعادل را جابه‌جا کرده و ثابت تعادل را تغییر می‌دهد.

(تجربی لیبر ۱۴)

۲۷۱۱. با توجه به واکنش: $2A(g) + D(g) \rightleftharpoons 2X(g), \Delta H < 0$ ، چند مطلب زیر، درباره آن درست است؟

- با کاهش دما، در جهت رفت جابه‌جا می‌شود. • با افزایش دما، ثابت تعادل آن، کوچک‌تر می‌شود.
 • افزایش فشار، سبب بزرگ‌تر شدن ثابت تعادل می‌شود. • کاهش فشار، سبب جابه‌جا شدن آن در جهت برگشت می‌شود.
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

۲۷۱۲. تعادل: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ در یک ظرف سر بسته یک لیتری در دمای $20^\circ C$ برقرار شده است ($\Delta H < 0$). چه تعداد از عبارات‌های زیر در رابطه با این تعادل درست است؟

- (آ) اگر در دمای ثابت، مقداری گاز N_2O_4 را وارد ظرف کنیم، در تعادل جدید مخلوط گازی کم‌رنگ‌تر از تعادل اولیه خواهد بود.
 (ب) اگر در دمای ثابت، دو مول گاز NO_2 و یک مول گاز N_2O_4 را وارد ظرف واکنش کنیم، رنگ مخلوط گازی دچار تغییر نمی‌شود.
 (پ) اگر دمای سامانه را به $8^\circ C$ برسانیم، مخلوط گازی پررنگ‌تر می‌شود.
 (ت) اگر در دمای ثابت مقداری گاز هلیوم را وارد سامانه کنیم، رنگ مخلوط گازی دچار تغییر نمی‌شود.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۷۱۳. تعادل: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ در یک ظرف ۵ لیتری برقرار است. در صورتی که مخلوط گازی در حالت تعادل کم‌رنگ‌تر خواهد بود.

- (۱) در دمای ثابت، مقداری گاز NO_2 وارد سامانه کنیم
- (۲) در دمای ثابت مقداری گاز N_2O_4 وارد سامانه کنیم
- (۳) دمای سامانه را افزایش دهیم
- (۴) در دمای ثابت، حجم ظرف واکنش را به ۱۰ لیتر برسانیم

۲۷۱۴. کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر نادرست است؟


«افزایش در سامانه تعادلی موجب می‌شود.»

- (۱) دما - $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ - افزایش تعداد کل مولکول‌های گازی
- (۲) فشار - $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ - کاهش غلظت Cl_2
- (۳) حجم - $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ - کاهش غلظت NO_2
- (۴) غلظت اکسیژن - $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$ - کاهش غلظت SO_3

۲۷۱۵. با توجه به داده‌های جدول زیر که به واکنش تعادلی: $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$ مربوط است، کدام عبارت درست است؟

دما ($^{\circ}C$)	[A] تعادلی ($mol.L^{-1}$)	[B] تعادلی ($mol.L^{-1}$)
۲۰۰	۰/۰۱	۰/۸۴
۳۰۰	۰/۱۷	۰/۷۶
۴۰۰	۰/۲۵	۰/۷۲

- (۱) مقدار ثابت تعادل واکنش برگشت در دمای $300^{\circ}C$ برابر $3/8$ است.
- (۲) افزایش دما، موجب افزایش سرعت واکنش‌های رفت و برگشت و افزایش ثابت تعادل می‌شود.
- (۳) این واکنش تعادلی، گرماده بوده و یکای ثابت تعادل آن $mol.L^{-1}$ است.
- (۴) هر دو عامل افزایش دما و کاهش فشار، تعادل را در یک جهت جابه‌جا می‌کنند.



۲۷۱۶. شکل (آ) مخلوط در حال تعادل را برای واکنش: $X_2(g) + Y_2(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ نشان می‌دهد.

هنگامی که واکنش در شکل (ب) به تعادل برسد، به ترتیب از راست به چپ، چند مول از گازهای X_2 ، Y_2 و Z در ظرف واکنش وجود خواهد داشت؟ (هر ذره، نشان‌دهنده ۱/۱ مول و حجم ظرف‌های واکنش، برابر ۲/۲۵ لیتر و دما ثابت است.)

- (۱) ۰/۴۰/۴۰/۱
- (۲) ۰/۱۰/۴۰/۱
- (۳) ۰/۲۰/۲۰/۲
- (۴) ۰/۲۰/۲۰/۲

۲۷۱۷. تعادل $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ در دمای معینی در یک ظرف یک لیتری برقرار است و از هر یک از دو گاز، یک مول در سامانه تعادلی وجود دارد.

اگر در دمای ثابت، یک مول گاز NO_2 وارد ظرف کرده و حجم سامانه تعادلی را به ۴ لیتر برسانیم، در تعادل جدید غلظت گاز NO_2 چند مولار است؟

- (۱) ۰/۲۵
- (۲) ۰/۵
- (۳) ۱
- (۴) ۲

۲۷۱۸. تعادل: $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$ در یک ظرف به حجم ۲ لیتر برقرار است. اگر عاملی باعث به هم زدن تعادل شده و پس از برقراری مجدد تعادل، غلظت‌ها به صورت داده‌شده در جدول زیر تغییر کرده باشد، عامل به هم زدن تعادل کدام بوده است؟

گونه‌های شیمیایی	[A]	[B]	K
غلظت‌های تعادلی در حالت (۱)	۴	۸۰	۵
غلظت‌های تعادلی در حالت (۲)	۲	۸۱	۲۰/۲۵

- (۱) افزایش فشار
- (۲) کاهش دما
- (۳) افزایش دما
- (۴) افزودن مقداری A

۲۷۱۹. با توجه به داده‌های جدول زیر، که به تعادل گازی: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ مربوط است، کدام مطلب درست است؟ (ریاضی خارج)

درصد مولی NH_3 در مخلوط تعادلی				دما ($^{\circ}C$)
	۱۰۰ atm	۱۰ atm	۱ atm	
۹۸	۸۲	۵۱	۶۵۰	۲۰۹
۸۰	۲۵	۴	۰/۵	۴۶۷
۱۲	۵	۰/۵	۰/۰۱۴	۷۵۸

- (۱) مجموع انرژی پیوندی قرارده از مجموع انرژی‌های پیوندی واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است.
- (۲) انرژی فعال‌سازی رقت بزرگ‌تر از انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت می‌باشد.
- (۳) در دمای ثابت، با افزایش فشار، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش می‌یابد.
- (۴) در فشار ثابت، با افزایش دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش می‌یابد.

۲۷۲۹. درصد مولی آمونیاک در کدام سامانه، پس از برقراری تعادل: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، بیشتر است؟

(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
$1.0 \text{ mol } N_2$ $2.0 \text{ mol } H_2$	$1.0 \text{ mol } N_2$ $2.0 \text{ mol } H_2$	$1.0 \text{ mol } N_2$ $2.0 \text{ mol } H_2$	$1.0 \text{ mol } N_2$ $2.0 \text{ mol } H_2$
حجم ظرف = ۱۰ L	حجم ظرف = ۱۰ L	حجم ظرف = ۵ L	حجم ظرف = ۵ L
دما = ۳۰۰ °C	دما = ۵۰۰ °C	دما = ۳۰۰ °C	دما = ۵۰۰ °C
بدون کاتالیزگر	حضور کاتالیزگر Fe	بدون کاتالیزگر	بدون کاتالیزگر
۴ (۴)	۲ (۳)	۲ (۳)	۱ (۱)

۲۷۳۰. در ظرف ۲ لیتری در بسته‌ای، ۱ مول گاز آمونیاک، ۲ مول گاز هیدروژن و ۲ مول گاز نیتروژن، در دمای معین، به حالت تعادل قرار دارند. ثابت تعادل برابر $L^3 \cdot \text{mol}^{-2}$ است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانه واکنش، ثابت تعادل و واکنش در جهت جابه‌جا می‌شود. $(N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g), \Delta H < 0)$

(ریاضی ۹۸)

- (۱) بزرگتر می‌شود، رقت
- (۲) ثابت می‌ماند، رقت
- (۳) کوچکتر می‌شود، برگشت
- (۴) ثابت می‌ماند، برگشت

۲۷۳۱. اگر در یک ظرف ۵ لیتری در بسته در دمای معین، ۴ مول گاز هیدروژن و ۳ مول گاز نیتروژن را مطابق فرایند هابر مخلوط و گرم کنیم و در حالت تعادل، ۲ مول گاز نیتروژن در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، ثابت تعادل این واکنش کدام است؟

(ریاضی تیرا ۱۴)

- (۱) ۵۰
- (۲) ۱۰۰
- (۳) ۸۰/۷۵
- (۴) ۴۰/۲۵

۲۷۳۲. در واکنش تولید NH_3 از گازهای N_2 و H_2 ، هر چه دما و فشار باشد، درصد مولی NH_3 در مخلوط تعادلی، بیشتر خواهد بود. در فرایند صنعتی هابر، درصد مولی آمونیاک در تعادل: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، در حدود درصد است.

- (۱) پایین‌تر، بالاتر، ۲۸
- (۲) پایین‌تر، پایین‌تر، ۸۸
- (۳) بالاتر، بالاتر، ۸۸
- (۴) بالاتر، بالاتر، ۲۸


۲۷۳۳. ۱۰ مول گاز نیتروژن و ۳۰ مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یکدیگر واکنش داده شده‌اند. حداکثر چند گرم آمونیاک، در ظرف واکنش تشکیل خواهد شد؟ $(N = 14, H = 1: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$

(تجربی خارج ۹۸)

- (۱) ۹۵/۲
- (۲) ۱۲۹/۲
- (۳) ۱۷۰
- (۴) ۳۴۰

۲۷۳۴. با توجه به شکل روبه‌رو، که تعادل فرایند هابر را در یک دما و فشار مشخص نشان می‌دهد، کدام مطلب درست است؟ (هر ذره را هم‌ارز ۲/۱ مول در نظر بگیرید.)

(ریاضی دی ۱۴۰۱)




۴ ارزش فناوری‌های شیمیایی

صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ کتاب درسی


سنتز: به فرایند شیمیایی هدف‌مندی گفته می‌شود که طی آن، با استفاده از مواد ساده‌تر، مواد شیمیایی دیگر را به دست می‌آورند.

نمونه‌هایی از فرایند سنتز برخی ترکیب‌ها:




- گاز اتن یکی از مهم‌ترین خوراک‌ها در صنایع پتروشیمی است.
- اتانول به عنوان ضدعفونی‌کننده کاربرد دارد.
- اتانوبیک‌اسید همان استیک‌اسید و ماده اصلی تشکیل‌دهنده سرکه است.
- پلی‌اتن جامدی سفید رنگ بوده و سازنده اصلی برخی محصولات پلاستیکی است.
- گاز اتان به عنوان سوخت در برخی کپسول‌های گازی مصرف می‌شود.
- کلرو اتان به عنوان اقیانیه بی‌حس‌کننده موضعی کاربرد دارد.
- اتیل استات به عنوان حلال چسب کاربرد دارد.
- با انجام فرایندهای سنتز، امکان تبدیل برخی مواد آلی به یکدیگر نیز وجود دارد. از جمله این فرایندها می‌توان به موارد روبه‌رو اشاره کرد:


ساخت بطری آب:



ساختار پلیمر موسوم به PET را می‌توان به صورت زیر نشان داد:



- PET پلاستیکی است که از آن برای تولید بطری آب استفاده می‌شود.
- PET نوعی پلی‌استر است که همانند سایر پلی‌استرها، از پلیمرشدن اسید آلی دو عاملی با الکل دو عاملی حاصل می‌شود.
- ضمن تولید PET از واکنش پلیمرشدن اتیلن گلیکول با ترفتالیک‌اسید، H₂O نیز تولید می‌شود.
- ترفتالیک‌اسید و اتیلن گلیکول در نفت خام وجود ندارند، بنابراین امکان به‌دست آوردن PET از مواد موجود در نفت خام به طور مستقیم، وجود ندارد. اما با استفاده از فرایندهای سنتز، می‌توان از پارازایلن و اتیلن (اتن) استخراج‌شده از نفت خام، به PET رسید.
- ضمن اکسیدکردن پارازایلن توسط محلول گرم و غلیظ پتاسیم پرمنگنات، علاوه بر ترفتالیک‌اسید، MnO₂ (موسوم به منگنز (IV) اکسید) نیز تولید می‌شود.
- در این واکنش، عدد اکسایش منگنز از (+۷) به (+۴) کاهش یافته و عدد اکسایش هر یک از دو اتم کربن متعلق به گروه متیل در پارازایلن، از (-۳) به (+۳) می‌رسد.




- تبدیل پارازایلن به ترفتالیک‌اسید دشوار بوده و دارای انرژی فعال‌سازی زیادی است. به همین دلیل، برای انجام واکنش، علاوه بر غلیظ‌بودن محلول پتاسیم پرمنگنات، لازم است گرما نیز داده شود. اما حتی در این شرایط نیز، بازده واکنش مطلوب نیست.
- PET همانند پلیمرهای سنتزی، ماندگاری زیادی دارد و در طبیعت به‌کندی تجزیه می‌شود. به همین دلیل، پسماند آن می‌تواند موجب مشکلات زیست محیطی شود.

بازیافت PET:


- پلاستیک‌ها به دلیل ویژگی‌هایی مانند چگالی کم، نفوذناپذیری نسبت به هوا و آب، ارزان‌بودن و مقاومت در برابر خوردگی، کاربردهای وسیعی در زندگی پیدا کرده‌اند.
- با توجه به زیست تخریب‌ناپذیر بودن پلاستیک‌ها، بازیافت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
- PET یکی از مواد پلاستیکی قابل بازیافت است.
- یکی از راه‌های بازیافت PET، این است که پس از شستشو و تمیزکردن بطری‌ها، آن‌ها را ذوب کرده و دوباره از آن‌ها برای تولید وسایل و ابزارهای دیگر استفاده شود.
- PET که نوعی پلی‌استر است، در واکنش با آب به مونومرهای سازنده (دی‌اسید+ دی‌الکل) قابل تبدیل است.
- PET در شرایط مناسب با متانول واکنش داده و به مواد مفیدی تبدیل می‌شود.

همه چیز در مورد متانول:

- مایعی بی‌رنگ، بسیار سمی و ساده‌ترین عضو خانواده الکل‌ها با فرمول ساختاری CH₃OH است.
- آن را می‌توان از تقطیر چوب تهیه کرد.
- در صنعت، آن را از اثر دادن گاز CO بر گاز H₂ در حضور کاتالیزگر و در شرایط مناسب به‌دست می‌آورند.




این واکنش در دمای C ۲۵۰° و فشار ۲۰ تا ۵۰ اتمسفر، انجام داده می‌شود.





(شکل صفحه ۱۱۵ کتاب درسی شیمی ۳ - چاپ ۱۴۰۲)

■ گاز متان مورد استفاده برای انجام این واکنش را می‌توان از گاز طبیعی، گاز مشعل یا زیست‌گاز تهیه کرد.



- تولیدات صنایع شیمیایی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- در شکل روبه‌رو، صنایع مختلفی که از تولیدات صنایع شیمیایی استفاده می‌کنند، نشان داده شده است.
- به این ترتیب مشخص می‌شود که میزان پیشرفت صنعت و عرصه‌های مختلف اقتصادی در کشور به شدت وابسته به میزان استفاده از علم شیمی و تکنولوژی برآمده از آن می‌باشد.

سوالات چهار گزینه‌ای

ارزش فناوری‌های شیمیایی

۲۷۳۵. سنتز به فرایند شیمیایی هدف‌داری گفته می‌شود که طی آن،
- (۱) یک ترکیب به عنصرهای سازنده آن تجزیه می‌شود.
 - (۲) یک ترکیب از عنصرهای سازنده آن، ساخته می‌شود.
 - (۳) با استفاده از مواد ساده‌تر، مواد شیمیایی دیگر را به‌دست می‌آورند.
 - (۴) از یک ترکیب پیچیده‌تر، برای تولید چند ماده ساده‌تر استفاده می‌شود.
۲۷۳۶. کدام گزینه در مورد اتن نادرست است؟
- (۱) در مجاورت کاتالیزگر با H_2 واکنش داده و هیدروکربن سیرشده تولید می‌کند که به‌عنوان سوخت، کاربرد دارد.
 - (۲) در دما و فشار مناسب، به جامد سفیدرنگی تبدیل می‌شود.
 - (۳) در واکنش با H_2O ، ماده‌ای تولید می‌کند که به‌عنوان ضدعفونی‌کننده کاربرد دارد.
 - (۴) در واکنش با گاز کلر، ترکیبی تولید می‌کند که به‌عنوان حلال چسب، کاربرد دارد.
۲۷۳۷. با توجه به معادله‌های زیر، کدام گزینه در مورد ماده آلی B نادرست است؟



- (۱) به‌عنوان حلال چسب کاربرد دارد.
- (۲) مولکول آن دارای ۱۴ پیوند کووالانسی است.
- (۳) ایزومر پروپانویک‌اسید است.
- (۴) از آب‌کافت آن، اتانویک‌اسید حاصل می‌شود.

۲۷۳۸. چه تعداد از عبارات‌های زیر درست است؟

- (آ) با استفاده از الکل‌ها می‌توان ترکیب‌هایی از خانواده آلدهیدها و کتون‌ها به‌دست آورد.
 - (ب) با اکسایش الکل‌ها می‌توان به ترکیب‌هایی از خانواده کربوکسیلیک‌اسیدها رسید.
 - (پ) برای تهیه PET از ترفتالیک‌اسید و اتیلن‌گلیکول که در نفت خام وجود دارند، استفاده می‌شود.
 - (ت) با اکسایش پارازیلن توسط محلول رقیق پتاسیم‌پرمنگنات، ترفتالیک‌اسید حاصل می‌شود.
- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)


۲۷۳۹. اتیلن‌گلیکول ترکیبی در آب است که مولکول آن، پیوند کووالانسی داشته و از اکسایش توسط محلول رقیق پتاسیم‌پرمنگنات حاصل می‌شود.

- (۱) محلول، ۹، اتن (۲) نامحلول، ۹، اتن (۳) محلول، ۱۰، اتین (۴) نامحلول، ۱۰، اتین

۲۷۴۰. در تبدیل اتن به اتیلن‌گلیکول، عدد اکسایش هر اتم کربن درجه تغییر کرده و پیوند بر تعداد پیوند اشتراکی در مولکول آلی افزوده می‌شود.

- (۱) یک، ۳ (۲) دو، ۳ (۳) دو، ۲ (۴) یک، ۲۰

۲۷۴۱. از اکسایش کدام ترکیب می‌توان ترفتالیک‌اسید تهیه کرد؟



(شبهه‌ساز ریاضی ۹۸)

(۴) پارازیلین و ترفتالیک اسید

(تجربی دی ۱۴۰۱)



(۴) ۱

۲۷۴۲. اختلاف شمار اتم H در مولکول کدام دو ترکیب بیشتر است؟

(۱) بنزوئیک اسید و نفتالن (۲) بنزالدهید و متیل بوتانوات (۳) ۲-هپتانون و استیرن
۲۷۴۳. با توجه به ساختار مولکول نشان داده شده، چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟

- از دو بخش مشابه متصل به یک حلقه بنزنی تشکیل شده است.
- شمار پیوندهای دوگانه، ۴ برابر شمار پیوندهای دوگانه در مولکول استیرن است.
- شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن، ۸/۰ - شمار پیوندهای کربن - هیدروژن است.
- شمار اتم‌های هیدروژن، دو برابر شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول ترفتالیک اسید است.

(۳) ۲

(۲) ۳

(۱) ۴

۲۷۴۴. در واکنش اکسایش پارازیلین توسط محلول گرم و غلیظ پتاسیم پرمنگنات، مجموع تغییر عدددهای اکسایش اتم‌های کربن، برابر و تغییر عدد اکسایش منگنز، برابر است.

(۴) ۳، ۶


(۳) ۳، ۱۲

(۲) ۴، ۱۲

(۱) ۴، ۶

۲۷۴۵. با توجه به معادله واکنش زیر (که موازنه نشده است)، ضمن تبدیل ۰.۵ - مول پارازیلین به ترفتالیک اسید، چند مول الکترون مبادله می‌شود؟

(شبهه‌ساز ریاضی ۹۹)





(۲) ۰.۵

(۱) ۰.۳




(۴) ۱

(۳) ۰.۶

۲۷۴۶. از ترکیب دی‌اسید سازنده PET با دی‌الکل HO-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH کدام پلی‌استر به دست می‌آید؟



۲۷۴۷. فرمول ساختاری پلی‌استر حاصل از واکنش اگزالیک اسید و اتیلن گلیکول کدام است؟



(شبهه‌ساز ریاضی ۹۸)



۲۷۴۸. واحد تکرارشونده پلی‌آمید حاصل از واکنش ترفتالیک اسید با دی‌آمین روبه‌رو، شامل چند اتم است؟





(۲) ۳۳

(۱) ۳۲

(۴) ۳۵

(۳) ۳۴

۲۷۴۹. اگر یکی از فرآورده‌های واکنش استر C₆H₁₂O₂ با آب، اتانویک اسید باشد، فرمول ساختاری استر اولیه به کدام صورت می‌تواند باشد؟



۲۷۵۰. ساختار PET به صورت است و از واکنش آبکافت آن، اتیلن گلیکول و حاصل می‌شود.

